Die Sonnenbrille hinterließ Spuren

Ein 25-jähriger Mann stellt sich mit seit vier Wochen bestehenden Schwellungen beider oberen Sprunggelenke vor, gleichzeitig trat eine Rötung und Gefäßinjektion im Bereich der Auflagestellen seiner Sonnenbrille auf. Die Anamnese ergab keinen Hinweis auf einen Zeckenbiss, eine bronchiale Problematik wurde von dem Nichtraucher verneint.

Bei der eingeleiteten weiteren Diagnostik ergab sich radiologischerseits (Röntgen-Thorax, Thorax-Computertomografie mit Kontrastmittel) eine Sarkoidose. Die Infektionsserologie auf arthrotrope Erreger zeigte einen negativen Befund.

Im Rahmen einer Sarkoidose kann ein Angiolupoid Brocq-Pautrier auftreten. Dabei zeigen sich rotviolette, indolente, flach-rundliche Infiltrate an den Brillenauflagestellen mit verdünnter Epidermis. Unter Glasspateldruck verschwindet das Erythem.

Bei langsamer Entstehung bestehen die Hauterscheinungen meist über Jahre ohne Rückbildungstendenz. Therapeutisch steht bei wesentlichen restriktiven pulmonalen Veränderungen eine lungenfachärztliche Behandlung im Vordergrund.

■ Dr. med. Jochen B. Müller, Facharzt für Allgemeinmedizin, Am Vogelsang 16, D-59457 Werl

Ihr besonderer Fall?

Sicher sehen auch Sie ab und an einen besonders eindrucksvollen Befund in Ihrer Praxis. Fotografieren Sie ihn, schreiben Sie uns unter dem Stichwort Blickdiagnose, bei Veröffentlichung erhalten Sie 100 Euro.

MMW-Fortschritte der Medizin

E-Mail: manhart@urban-vogel.de

Fax: 089/4372-1420

Weitere interessante Blickdiagnosen finden Sie in unserem Online-Archiv unter www.mmw.de.

Keyword: angiolupoid