Multiple Knötchen in der Achsel

An welche Stoffwechselstörung denken Sie?

Bei dem 55-jährigen adipösen Patienten (114 kg/172 cm/BMI 39 kg/m²/Bauchumfang 110 cm) fallen insbesondere an den Achseln multiple weiche, teils gestielte Knötchen auf.

— Bei diesen Knötchen handelt es sich um typische weiche Fibrome bzw. Fibroma pendulans. Diese treten mit steigendem Alter insbesondere bei adipösen Patienten häufiger auf. Sie kommen auch am Hals und in der Leiste vor.

Multiple Fibrome können ein Hautzeichen eines Diabetes mellitus darstellen. Bei diesem Patienten liegt bereits das Vollbild eines metabolischen Syndroms mit Adipositas, Diabetes mellitus Typ-2, Dyslipidämie und arterieller Hypertonie vor.

Störende Fibrome können mit Scherenschlag entfernt werden.

Keyword: pedunculated fibroma

■ Dr. med. Matthias Winter,
Nördlinger Straße 33, D-91550 Dinkelsbühl

Ihr besonderer Fall?

Sicher sehen auch Sie ab und an einen besonders eindrucksvollen Befund in Ihrer Praxis. Fotografieren Sie ihn, schreiben Sie uns unter dem Stichwort Blickdiagnose, bei Veröffentlichung erhalten Sie 100 Euro.

MMW-Fortschritte der Medizin
E-Mail: manhart@urban-vogel.de
Fax: 089/4372-1420

Weitere interessante Blickdiagnosen
finden Sie in unserem
Online-Archiv unter www.mmw.de.

Foto: M. Winter