Patient mit Streptokokken-Tonsillitis

Übler Ausschlag nach der Behandlung

Der 21-jährige Patient wurde mit seit zehn Tagen zunehmendem Hautausschlag in unserer Notaufnahme vorstellig. Wegen Halsschmerzen hatte er vor sieben Tagen seinen Hausarzt aufgesucht. Dieser stellte eine Tonsillitis fest. Ein Streptokokken-Schnelltest war positiv.

— Die Tonsillitis wurde mit Penicillin V erfolgreich behandelt. Bereits bei der Erstvorstellung hatten einzelne Hautläsionen bestanden. Dieser Ausschlag verschlechterte sich und breitete sich über den gesamten Torso sowie die Extremitäten des Patienten aus. Gegen den starken Juckreiz behandelte sich der Patient selbst erfolglos mit Cetirizin (Zyrlex®).

Der Patient war anamnestisch absolut gesund, im Kindesalter waren keinerlei Hautausschläge aufgetreten, Allergien waren nicht bekannt. Gelenksbeschwerden, Fieber oder gastrointestinale Beschwerden wurden verneint. Der Patient war Nichtraucher. Der Alkoholenuss wurde als mäßig beschrieben. In der Familie waren bisher keinerlei Atopien, Allergien, Asthma, Autoimmun- oder Hauterkrankungen aufgetreten.

Die erythematösen Läsionen waren teils pustulös, teils makulopapulös mit Konfluenz und starker Schuppung. Einzelne schmerzhaft Hautrisse (Rhagaden) ohne klare Zeichen einer Superinfektion waren in den Läsionen vorhanden. Es bestanden weder Gelenkschwellungen noch Zeichen einer Uveitis.

Klinisch wurde die Diagnose einer ausgesprochenen Psoriasis guttata gestellt. Das Routinelabor war normal.

Nach Kontakt mit dem Dienst habenden Dermatologen wurde der Patient mit Betametason 0,1% mit Neomycin 0,5% zweimal täglich anbehandelt. Aufgrund des Juckreizes und Infektionsrisikos wurde die Behandlung mit Hydroxyzin 10 mg (Atarax®) und Klindamycin 300 mg (Dalcin®) zweimal täglich per os komplettiert. Der Patient wurde zur weiteren Abklärung und Behandlung halbakut an die dermatologische Klinik überwiesen.

Fotos (2): U. Schilling

Diagnose: Psoriasis guttata

Die Psoriasis guttata ist eine typische Form der Erstmanifestation der Psoriasis. Häufig tritt sie wie im beschriebenen Fall nach einer Erkältung oder Tonsillitis, vor allem in Verbindung mit einer Streptokokkeninfektion auf. Verschiedene Medikamente (u. a. Malariamittel, Lithium, Betablocker), Alkohol, psychischer und physischer Stress und hormonelle Umstellungen scheinen den Krankheitsausbruch zu triggern.

Keyword: guttate psoriasis

- Ulf Martin Schilling, Akutkliniken, Linköpings Universitetssjukhus, Leiter: Jan Ljunghusen/Kerstin Skog, 58280 Linköping, Schweden

Ihr besonderer Fall?

Sicher sehen auch Sie ab und an einen besonders eindrucksvollen Befund in Ihrer Praxis. Fotografieren Sie ihn, schreiben Sie uns unter dem Stichwort Blickdiagnose, bei Veröffentlichung erhalten Sie 100 Euro.

MMW-Fortschritte der Medizin
E-Mail: manhart@urban-vogel.de
Fax: 089/4372-1420