Etwas genauer hinsehen bitte!

Nicht jede Beule in der Leiste ist eine Hernie

Eine 69-jährige Frau wurde vor einem Jahr endoskopisch an einem „Schenkelbruch“ der linken Leiste operiert. Nach dem Eingriff besteht immer noch eine schmerzlose Schwellung in der linken Leiste, die sich besonders beim Husten bemerkbar macht.

— Klinisch lässt sich im Stehen eine wei-
che eindrückbare Schwellung unterhalb
des linken Leistenbandes tasten, die sich
beim Valsalvatest prall vorwölbt. Inspekto-
risch ist eine Seitenastvarikose des linken
ventralen Ober- und lateralen Unterschen-
kels auffällig. Die Diagnose ist duplexso-
nografisch leicht zu stellen. Es findet sich
ein venöses Aneurysma der inguinal mün-
denden varikösen V. saphena accessoria la-
teralis mit einem Durchmesser von etwa
3 cm.

Therapie der Wahl ist eine chirurgische
Sanierung. Venöse Aneurysmen und an-
eurysmatisch erweiterte Varizen neigen
zur Thrombosierung. In dem vorliegenden
Fall wäre dann aufgrund der Krossen na-
hen Lokalisation eine Embolisation von
Thromben zu befürchten.

Keyword: venous aneurysm

■ PD Dr. med. Uwe Müller-Bühl, Abteilung
Allgemeinmedizin und Versorgungsfors-
chung, Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg, Voßstraße 2, D-76115 Heidelberg

Ihr besonderer Fall?

Sicher sehen auch Sie ab und an einen be-
sonders eindrucksvollen Befund in Ihrer
Praxis. Fotografieren Sie ihn, schreiben Sie
uns unter dem Stichwort Blickdiagnose, bei
Veröffentlichung erhalten Sie 100 Euro.

MMW-Fortschritte der Medizin
E-Mail: manhart@urban-vogel.de
Fax: 089/4372-1420

**Weitere interessante Blickdiagnosen
finden Sie in unserem
Online-Archiv unter www.mmw.de.**

Fotos (2): U. Müller-Bühl