Sie lesen Qualität

Damit das auch so bleibt,
befragen wir Sie in

Kooperation mit **tns infratest**
in den nächsten Wochen.

Ihr Urteil ist uns wichtig.

Bitte nehmen Sie teil!

©Marazzi/spl/Agentur Focus

Erhöhte Pankreasenzyme können erstes Anzeichen eines Karzinoms sein.

Was verursacht die asymptomatische Pankreasenzym-Erhöhung?

Findet sich bei einem asymptomatischen Patienten eine Erhöhung der Pankreasenzyme, stellt sich die Frage der weiteren Abklärung.

— Im Rahmen einer Studie wurden 75 asymptomatische Patienten mit einer chronischen asymptomatischen Pankreashyperenzymämie (45 Männer, 30 Frauen, mittleres Alter 52 Jahre) weiter abgeklärt. Alle zeigten einen unauffälligen Ultraschallbefund des Abdomens. Die Indikation für eine weitergehende Diagnostik mittels Bildgebung oder ERCP wurde von dem behandelnden Arzt gestellt. Die durchschnittliche Beobachtungsdauer lag bei 3,3 Jahren. Bei 50,7% dieser Patienten wurde während dieses Zeitraums eine pankreatische oder extrapancreatische Erkrankung diagnostiziert, nämlich bei 20 Patienten eine chronische Pankreatitis, bei einem Patienten eine Autoimmunpankreatitis, bei einem Patienten eine benigne Pankreaszyste, bei zwei Patienten seröse Zystadenome, bei fünf Patienten ein intraduktales papilläres muzinöser Tumor des Pankreas, bei drei Patienten ein duk-

tales Pankreasadenokarzinom, bei vier Patienten eine chronische Virushepatitis und bei zwei Patienten ein Morbus Crohn.

Bei jedem zweiten Patienten konnte keine pankreatische oder extrapancreatische Erkrankung nachgewiesen werden. Bei 31 Patienten wurde die Diagnose „chronische nicht pathologische Pankreashyperenzymämie“ gestellt.

Kommentar

Die Ergebnisse belegen eindrucksvoll, dass es dringend erforderlich ist, bei Patienten mit asymptomatischer Pankreasenzym-erhöhung im weiteren Verlauf nach einer Pankreaserkrankung, insbesondere einem Pankreaskarzinom zu fahnden, da sich die Enzymerhöhung nur bei jedem zweiten Betroffenen im weiteren Verlauf als eine chronische nicht pathologische Hyperenzymämie herausstellte.

P. STIEFELHAGEN ■

■ R. Pezzilli et al.

Chronic asymptomatic pancreatic hyperenzymemia is a benign condition in only half of the cases: A prospective study. *Scand. J. Gastroenterol.* 44 (2010) 888–893