Dabigatran gegen Thromboembolien

Antikoagulation wird einfacher

— In Deutschland ist Dabigatranetexilat (Pradaxa®) derzeit zur Prophylaxe von venösen Thromboembolien bei erwachsenen Patienten nach elektivem Hüft- oder Kniegelenkersatz zugelassen. Das oral einzunehmende Antikoagulans hemmt sowohl freies als auch fibrin gebundenes Thrombin. Wegen der vorhersagbaren Wirkung auf die Blutgerinnung ist ein routinemäßiges Monitoring unnötig. Der direkte Thrombinhemmer gehört zu den Bewerbern für den Galenus-von-Pergamon-Preis 2010. Mit diesem Preis würdigt die Ärzte Zeitung jedes Jahr herausragende Arzneimittel-Innovationen.

Prävention und Therapie venöser Thromboembolien

Im RE-VOLUTION-Programm mit mehr als 38 000 Patienten ist Dabigatranetexilat einer umfassenden klinischen Prüfung unterzogen worden. Die Studien RE-MODEL und RE-NOVATE mit mehr als 5500 Patienten haben zur Zulassung für die Primärprävention venöser Thromboembolien nach Gelenkersatzoperationen geführt. Sowohl nach Hüft- als auch nach Kniegelenkersatz erwies sich der direkte Thrombinhemmer, gemessen am primären Studienendpunkt (Gesamtzahl der venösen Thromboembolien und Gesamtsterblichkeit), als ebenso wirksam wie Enoxaparin.

In der RE-COVER-Studie ist Dabigatranetexilat in der Thrombostherapie bei 2539 Patienten mit akuter Beinvenenthrombose und/oder Lungenembolie mit dem Vitamin-K-Antagonisten Warfarin verglichen worden. Nach sechs Monaten waren bei 30 Patienten (2,4%) unter Dabigatran und bei 27 Patienten (2,1%) unter Warfarin erneut Thromboembolien aufgetreten. Die Rate schwerer Blutungen war in beiden Gruppen ähnlich. Dagegen war das Risiko für Blutungen aller Schweregrade unter dem Thrombinhemmer signifikant um 29% geringer.

Alternative zu Marcumar

In der RELY-Studie ging es darum, ob sich eine bessere Alternative zur Antikoagula-

tion mit Vitamin-K-Antagonisten für die Langzeitprophylaxe des Schlaganfalls bei Patienten mit Vorhofflimmern finden lässt: 18 113 Patienten mit Vorhofflimmern und erhöhtem Schlaganfallrisiko wurden im Schnitt zwei Jahre lang mit Dabigatranetexilat (110 mg oder 150 mg, jeweils zweimal täglich) oder mit Warfarin behandelt.

In der Dosierung 150 mg zweimal täglich bewies Dabigatranetexilat eine überlegene Wirksamkeit: Die Rate von Schlaganfällen und systemischen Embolien (primärer Endpunkt) wurde im Vergleich zu

Warfarin signifikant um 34% reduziert – bei gleichem Risiko für schwere Blutungen. In der Dosis 110 mg zweimal täglich bot der direkte Thrombinhemmer bei gleicher Wirksamkeit ein höheres Maß an Sicherheit: Schwere Blutungskomplikationen traten im Vergleich zur Antikoagulation mit Warfarin signifikant seltener auf. Mit beiden Dosierungen von Dabigatranetexilat gab es signifikant weniger hämorrhagische Schlaganfälle als mit Warfarin.

■ ob

Sesamöl gegen Rhinitis sicca

Balsam für die Atemwegsschleimhaut

Die Schleimhaut der Atemwege wird multipel strapaziert – etwa durch Klimaanlage, Zigarettenrauch oder starke Beanspruchung der Stimme – und damit der Weg zu einer Rhinitis sicca gebahnt. Die Rhinitis sicca versetzt das mukoziliäre System laut Dr. Thorsten Zehlicke, Oberarzt der HNO-Klinik des Hamburger Bundeswehr-Krankenhauses, „in Daueralarm“ mit folgenschweren Konsequenzen. Unbehandelt führt sie unter anderem „zu gehäuften Infekten, da die Abwehrfunktion der Schleimhaut beeinträchtigt ist“.

Sesamöl zur dauerhaften Befeuchtung

Um trockene und gereizte Atemwegsschleimhaut adäquat zu therapieren, ist es entscheidend, so Prof. Dr. Hans Behrbohm, HNO-Facharzt Park-Klinik Weißensee Berlin, „sie dauerhaft zu befeuchten“. Dies gelingt durch Sesamöl, wie eine Beobachtungsstudie unter Leitung von Zehlicke zeigte. Bei den Studienteilnehmern handelte es sich um 24 deutsche ISAF-Soldaten, die im Zuge ihres Afghanistaneseinsatzes an Rhinitis sicca erkrankt waren. Nach zehntägiger

Therapie mit Sesamöl (GeloSitin®) hatten sich die Beschwerden bei über 80% der Probanden signifikant verbessert – bei sehr guter Verträglichkeit und auch unter den „Extrembedingungen nahe des Hindukusch“, so Zehlicke. Die hohe Wirksamkeit belegten auch zwei schwedische Studien (Björk-Eriksson et al. Rhinology 2000; Johnsen et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001): Sesamöl verbleibt bis zu neunmal länger auf der Nasenschleimhaut als wässrige Lösungen.

Den gleichen Therapieeffekt hat Hyaluronsäure (Gelorevoice® Halstabletten) auf die Rachenschleimhaut: Sie bildet einen Hydrogelkomplex, der eine sofortige und lang anhaltende Befeuchtung sicherstellt. Nach den Erfahrungen von Behrbohm reduziert das die Symptome einer akuten wie chronischen Pharyngitis bereits nach drei Tagen um 60%: „Der Hyaluronsäure-Komplex, isoliert oder adjuvant zu Antibiotika, ist Balsam für die Schleimhaut.“

■ Birgit Frohn
Pressekonferenz, Hamburg, 21. Mai 2010
(Veranstalter: G. Pohl-Boskamp)