Kommentar: Das australische Diabetespräventionsprogramm ist das Einzige weltweit, welches auf nationaler Ebene implementiert wurde. Die diabetespräventiven Erfolge in dem Programm sind beachtlich. Allerdings zeigt die hier vorgestellte Untersuchung, dass es ein Defizit hinsichtlich Verbesserung der Blutdruck- und Dyslipidämitherapie gibt. Es scheint so zu sein, dass andere behandlungsbedürftige Risikofaktoren im Rahmen des metabolischen Syndroms durch den Fokus auf die Diabetesprävention zu wenig beachtet wurden oder deren Relevanz im Interventionsprogramm unterrepräsentiert war. Das meta-

bolische Syndrom als Cluster von Risikofaktoren und pleiotropen Effekten auf die Mortalität und Morbidität der Patienten ist keine Fiktion, sondern im Bereich Prävention chronischer Erkrankungen unser Hauptbeschäftigungsfeld. Die Beachtung des Lipidstoffwechsels und Blutdrucks während einer Lebensstiländerung zur Senkung des Diabetesrisikos sollte Kernbestandteil eines erfolgreichen Interventionsprogramms sein. Die australischen Daten zeigen, dass da noch Handlungsbedarf besteht, was ebenfalls relevant für Programme z.B. in Deutschland und der EU ist.

Prof. Dr. med. Peter E. H. Schwarz, Dresden

Nachhaltige Diabetesprävention

Yes, we can!

Fragestellung: Wie nachhaltig ist eine Lebensstilintervention zur Typ-2-Diabetes-Prävention?

Hintergrund: In den 2,8 Jahren des Diabetes Prevention Program (DPP), einer klinischen Studie in den USA, wurde das Typ-2-Diabetesrisiko mit einem intensiven Lebensstilinterventionsprogramm im Vergleich zur Kontrollgruppe um 58% gesenkt. Die Autoren untersuchten zehn Jahre nach der Randomisierung die Nachhaltigkeit der Interventionen.

Patienten und Methodik: 2766 der 3150 (88%) Teilnehmer absolvierten das Follow-up, und zwar mit einer mittleren Verlaufszeit von 5,7 Jahren. Dabei waren 910 Teilnehmer in der Lebensstilinterventions-, 924 in der Metformin- und 932 in der Placebogruppe.

Nach dem Ende der DPP-Studie wurde allen ein intensives Lebensstilprogramm empfohlen, da dies das beste Ergebnis hatte. Die ursprünglich mit Met-

formin Behandelten erhielten es zusätzlich zur Lebensstiländerung weiter. Endpunkt war die Diabetesmanifestation.

Ergebnisse: In den zehn Jahren der Nachbeobachtung nahmen die Teilnehmer der Lebensstilgruppe wieder zu. Jene in der MetforminGruppe hielten ihre geringe Gewichtsreduktion. Die Diabetesinzidenz lag bei 4,8 Fällen auf 100 Personen in der intensiven Lebensstilgruppe, 7,8 in der MetforminGruppe und elf in der Placebogruppe. Im separat betrachteten Follow-up waren die Inzidenzen in den drei Gruppen mit 4,9 bis 5,9 ähnlich. Zehn Jahre nach der Randomisierung für die DPP-Studie war sie um 34% in der Lebensstilgruppe und um 18% in der MetforminGruppe reduziert.

Schlussfolgerung: Personen mit initialer Lebensstilintervention hatten ebenso einen nachhaltigen Nutzen wie jene, die mit Metformin behandelt worden waren.

Knowler WC, Fowler SE, Hamman RF et al. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. *Lancet* 2009; 14;374(9702): 1677–86.

Kommentar: Die Follow-up-Daten der DPP-Studie bestätigen die der finnischen DPS-Studie, dass der Effekt einer initialen Lebensstilintervention nach zehn Jahren immer noch existiert, selbst bei Verlust des Effektes der Gewichtsreduktion. Der Hintergrund dafür ist sicher die pleiotrope Wirkung einer Lebensstiländerung, die nicht nur den Stoffwechsel und das Verhalten der Risikoperson positiv beeinflusst. Wir müssen erkennen, dass

nach einer erfolgreichen Lebensstilintervention die Gewichtsreduktion als Zielgröße wieder verloren geht.

Was lernen wir daraus? Eine erfolgreiche Lebensstiländerung baut ein „Nutzenkonto“ auf, das selbst bei Gewichtszunahme langfristige positive metabolische Auswirkungen hat.

Prof. Dr. med. Peter E. H. Schwarz, Dresden