Amputationen an der unteren Extremität

Schlechte BZ-Einstellung erhöht Risiko

Fragestellungen: Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen erhöhten HbA_{1c}-Werten und Amputationen der unteren Extremität in epidemiologischen Studien? Kann durch eine verbesserte Blutzuckereinstellung die Amputationshäufigkeit gesenkt werden?

Hintergrund: Diabetes erhöht das Risiko für Amputation an der unteren Extremität dramatisch. Hauptursache dafür sind das Auftreten einer peripheren Neuropathie und einer vermehrt und stärker ausgeprägten PAVK bei Diabetes. Interventionsstudien haben gezeigt, dass die Neuropathie durch eine gute Stoffwechseleinstellung positiv beeinflusst wird und dies wahrscheinlich auch für die PAVK zutrifft. Obwohl epidemiologische Studien Hinweise geben, dass die Qualität der Stoffwechseleinstellung bei Bestehen eines Diabetes einen Einfluss auf die Häufigkeit von Amputationen ausübt, ist die Datenlage hierzu nicht eindeutig. Dies liegt besonders daran, dass Amputationen ein später Endpunkt sind und es noch andere Risikofaktoren für Amputationen gibt. In der vorliegenden Metaanalyse versucht man, vorhandene prospektive epidemiologische Studien zu dieser Frage auszuwerten.

Patienten und Methodik: Es wurden nur Studien verwendet, bei denen prospektiv die Amputationshäufigkeit und der HbA_{1c} zur Bestimmung der Stoffwechselkontrolle ermittelt wurden. Es wurden nur Daten von Personen verwendet, die keine akute Fußulzeration und keine frühere Amputation hatten. Es wurden 14 Studien eingeschlossen mit 94640 Patienten und 1227 Amputationen.

Trotz dünner Datenlage ist klar: Durch eine gute Diabeteskontrolle hätte er seinen Fuß wohl nicht verloren.

Ergebnisse: Es fand sich eine signifikant erhöhte Risiko-Ratio (RR) von 1,26 (95%-KI, 1,16–1,36) für jeden Anstieg des HbA_{1c} um einen Prozentpunkt. Die RR für Typ-2-Diabetes war mit 1,44 (95%-KI, 1,25–1,65) höher als bei Typ-1-Diabetes mit 1,18 (95%-KI, 1,02–1,38). Dieser Unterschied war jedoch nicht signifikant.

Schlussfolgerung: Die Analyse weist bei schlecht eingestelltem Diabetes ein erheblich erhöhtes Risiko für Amputationen an der unteren Extremität nach. Die Autoren schlussfolgern, dass das Amputationsrisiko trotz des Fehlens beweisender Interventionsstudien bei Patienten mit schlechter DiabetesEinstellung erhöht ist und es wahrscheinlich durch eine bessere Einstellung sinken könnte.

Adler AI, Erqou S, Lima TAS, Robinson AHN. Association between glycated haemoglobin and the risk of lower extremity amputation in patients with diabetes mellitus – review and meta-analysis. *Diabetologia* 2010;53:840–9.

Kommentar: In vielen Interventionsstudien zum Einfluss einer besseren Blutzuckereinstellung sind Amputationen entweder nicht untersucht worden (z.B. DCCT) oder nicht berichtet (z.B. ACCORD, VADT) oder es trat gar keine Amputation in dem Kollektiv im untersuchten Zeitraum auf (z.B. Kumamoto). Andererseits fanden sich in der UKPDS und der PROactive-Studie kein positiver Effekt der besseren DiabetesEinstellung auf die Häufigkeit von Amputationen. Hauptursache für diese spärlichen Zahlen ist, dass die meisten Studien nicht entsprechend gepowert waren, da Amputationen wesentlich seltener auftreten als z.B. eine Neuropathie. Da der positive Effekt einer guten DiabetesEinstellung zumindest auf die mikroangiopathischen Endpunkte

unumstritten ist, wird auch in Zukunft, aus ethischen Gründen, keine Interventionsstudie zur Lösung dieser Frage mehr möglich sein. Daher kommt der Aufarbeitung der vorhandenen epidemiologischen Evidenz eine große Bedeutung zu. Eine verbesserte Blutzuckereinstellung sollte daher auch zur Reduktion des hohen Amputationsrisikos angestrebt werden. Die effektivste Intervention, um Majoramputationen zu vermeiden, bleibt dennoch die Betreuung von Hochrisikopatienten in Diabetes-Fußambulanzen.

Professor Dr. med. Maximilian Spraul
Mathias-Spital & Jakobi-Krankenhaus (Med Klinik III)
Interdisziplinäres Diabetes-Fuß-Zentrum
Frankenburgstr. 31, D-48431 Rheine
m.spraul@mathias-spital.de

**Prof. Dr. med.
Maximilian Spraul**