Panikstörung

VON H. S. FÜEßL

Eine 38-jährige Frau sitzt abends mit ihrer Freundin beim Essen in einem Restaurant. Die Stimmung ist gelöst, man hat etwas Alkohol getrunken. Plötzlich fällt der Frau das Besteck auf den Teller. Sie fängt heftig zu zittern an, klagt über Luftnot, Herzklopfen, Erstickungsgefühle und hat Angst, sie würde jetzt und hier auf der Stelle sterben. Die Umstehenden vermuten einen Herzinfarkt und rufen den Notarzt.

Situation und Symptomatik

Die Panikstörung ist durch wiederkehrende schwere Angstattacken gekennzeichnet, die sich nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beziehen. Sie sind deshalb auch nicht vorhersehbar. Im Verbund mit der Angst treten bei der Panikstörung mindestens vier der folgenden Symptome auf:

- Dyspnoe
- Erstickungsgefühl, Engegefühl am Hals, Druck im Kopf
- Palpitationen, Tachykardie, Blutdruckanstieg
- Schmerzen oder Druck in der Brust oder im Bauch
- Schwindel und Unsicherheitsgefühl
- Parästhesien an Händen und Füßen
- Mundtrockenheit
- Hitze- und Kältewellen
- Zittern
- Erbrechen, Diarrhö, Harndrang
- Furcht zu sterben oder verrückt zu werden.

Diese Symptome sind nicht durch eine körperliche oder psychische Krankheit bedingt. Da man das bei der ersten Begegnung mit einem derartigen Patienten nicht weiß und die Patienten in diesem Zustand meist wenig zur Vorgeschichte beitragen können, wird aufgrund der somatischen Symptome zunächst fast immer eine schwerwiegende körperliche Erkrankung angenommen. Fremdanamnestic kann der erstbehandelnde Arzt aber häufig Informationen über die Häufigkeit und Dauer der Attacken bekommen.

Sofortdiagnostik

Eine körperliche Untersuchung ist unbedingt erforderlich: Puls und Blutdruck? Atemgeräusch? Zyanose? Abdomen? Pupillenreaktion? Paresen? Prüfung des Sensoriums; Hinweise auf Entzugs- oder Intoxikationssyndrome.

Voraussetzung für die Diagnose einer echten Panikattacke sind mindestens drei Anfälle innerhalb von drei Wochen, die nicht durch einen phobischen Stimulus ausgelöst und nicht Folge einer körperlichen Erschöpfung oder einer lebensbedrohlichen Erkrankung sind.

Therapeutische Sofortmaßnahmen

Ruhe bewahren, sich weder von der Angst des Patienten anstecken lassen noch sie herunterspielen. Der Patient empfindet diese Situation unabhängig von der fehlenden akuten objektiven Bedrohung als lebensbedrohlich. Ärztliche Rituale pflegen, Geborgenheit und Sicherheit vermitteln.

Bei schweren Angstzuständen Diazepam (Valium®) 5 bis 10 mg oder Clorazepat (Tranxilium®) 50–100 mg i. m. oder i. v.; cave: keine i. m. Injektionen, wenn man auch an ein akutes Koronarsyndrom denkt! Bei weniger schweren Attacken 1–5 mg Lorazepam (Tavor®). Zunächst Reaktion des Patienten auf das Erscheinen des Arztes abwarten, ehe man vorschnell Tranquilizer und Anxiolytika verabreicht.

Woran noch denken, was noch tun?

Auch beim Fehlen eines augenfälligen körperlichen Befundes sollte man nicht ohne Weiteres und sofort auf eine psychische Genese des Angstzustandes schließen. Eine Überwachung des Patienten ist daher zu empfehlen. Bei Suizidalität Klinikeinweisung erforderlich. Bei vielfach wiederholten Attacken ist eine Überweisung zum Psychotherapeuten oder Psychiater erforderlich.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. med. H. S. Fießl, Internistische Abteilung,
Bezirkskrankenhaus Haar, Ringstr. 33 A, Postfach 1111,
D-85540 Haar, E-Mail: fueessl@krankenhaus-haar.de