From 1983 to 1989, we inserted PDG and PROXIMA cementless acetabular rings.

This represents an experience of approximately 1500 implants, out of which 20% were inserted under the age of 50, with, usually, a cementless femoral stem and in rare cases a cemented.

These two acetabular rings presented a smooth surface facing the bony acetabular ring ; the flattened cone shape of the PDG (Fig. 1) rings differentiated itself from the semihemispheric shape of the PROXIMA rings (Fig. 2).

A study was performed on 130 patients aged under 50 with a surgical follow-up of over 3 years.

It emerges from this study that primary stability has always been excellent; secondary migration (towards the 7th year generally) was more frequent on the PROXIMA rings than on the PDG rings.

Revisions were more often due to the femoral stems than to the acetabular rings, which were freely changed towards the 7th or 8th year postoperatively, particularly if migration signs, even only slightly symptomatic, were to be seen.

We do not think it is desirable to condemn overall screwed acetabular rings, but only these types of ring which

did not present either a surface effect nor , a fortiori, an hydroxyapatite coating favoring bony ingrowth (as is usual in impacted cups nowadays...).

An appropriate conception, a suitable and not selftapping device, an efficient surface effect and a hydroxyapatite coating may be elements that should prevent the wholesale rejection of screwed acetabular rings.

Book review **Analyse de livre**

Eur J Orthop Surg Traumatol (1996) 6 : 216

Le crâne humain

Ostéologie. Anatomie radiologique

J. Bories (1996) Springer-Verlag France, Paris Berlin Heidelberg New York, 350 p., 434 ill., broché, 395 FF (ISBN 2-287-59634-B)

Cette monographie se divise en quatre parties d'inégale longueur. La première, de loin la plus développée, est une description détaillée de chacun des os du crâne de l'adulte. La deuxième étudie le crâne de l'adulte dans son ensemble et l'évolution du crâne de l'âge adulte à la sénescence. La troisième partie est consacrée à l'anatomie radiographique, scanographique et en Imagerie par Résonance Magnétique. La quatrième partie, enfin, étudie le crâne du nouveau-né et l'évolution du crâne de la naissance à l'adolescence.

Il s'agit d'un travail très complet dont les qualités sont nombreuses. D'une part, il utilise la nomenclature internationale francisée avec, bien entendu, le rappel des termes anciens tandis qu'en début d'ouvrage, un lexique permet au profane de se familiariser avec ce nouveau vocabulaire. D'autre part, il bénéficie d'une icono-

graphie particulièrement riche et homogène avec 434 figures. Les schémas sont à la fois simples, précis et faciles à consulter en raison d'une excellente correspondance entre le texte et les images. En ce qui concerne le chapitre d'imagerie médicale, chaque incidence radiographique ou scanographique est accompagnée d'un schéma annoté très complet.

En conclusion, cet ouvrage permet d'acquérir une connaissance incomparable de l'ostéologie et de l'anatomie radiologique du crâne humain. La seule critique qu'on pourrait éventuellement formuler est qu'une telle abondance d'information peut en rendre la lecture un peu fastidieuse.

E. Rapp

(contd./suite p. 236)

La Table Ronde du GECO 1996 concernant les résultats des prothèses totales de hanche, mises en place avant l'âge de 50 ans, ne pouvait pas se contenter des seules séries des membres du GECO.

Il est apparu rapidement aux rapporteurs que pour enrichir les résultats, conforter ou au contraire discuter certaines conclusions de cette série, il était nécessaire de faire appel à des expériences extérieures au GECO :

- soit parce qu'elles témoignaient d'une expérience monolithique d'une équipe,

- soit parce qu'elles reflétaient l'expérience d'un opérateur fidèle sur plusieurs dizaines d'années à une méthode univoque,

- soit enfin parce qu'elles témoignaient d'une expérience particulière d'une équipe ou d'un auteur dans un domaine spécifique.

C'est pourquoi il a été fait appel à certains auteurs connus pour leur expérience quasi-exclusive de la chirurgie de la hanche prothétique.

C'est ainsi que nous avons demandé à deux équipes parisiennes de nous rapporter leur expérience, l'une de la prothèse de Charnley-Kerboul, l'autre de la prothèse alumine-alumine :

B. Chamberlin rapporte l'expérience de Marcel Kerboul à propos de 145 prothèses Charnley-Kerboul chez des malades de moins de 40 ans.

L. Sedel rapporte l'expérience d'une longue série de prothèses alumine-alumine.

Dans le cadre d'une technique univoque, ce sont J.N. Argenson rapportant l'expérience d'Aubaniac sur les prothèses sur mesure et D. Schmitt, celle des prothèses réhabilitables qui nous ont fait part de leurs résultats.

Y. Cirotteau qui a développé une curieuse prothèse à appui cortical fémoral externe, présente sa série.

L'analyse de ces différentes séries confirme la disparité des résultats surtout en ce qui concerne les reprises ; il nous est apparu que chaque équipe ayant tiré les leçons des premiers échecs,

avait remédié aux défauts originels, et disposait aujourd'hui d'une prothèse qui leur donne une totale confiance.

Le problème des allogreffes dans les tumeurs et les reconstructions massives a été développé par D. Poitout dont on connaît l'expérience dans ce domaine.

De la même façon, J. Puget pour le cotyle et P. Lecestre pour le fémur ont fait part de leur expérience dans le cadre des reprises difficiles. P. Lascombes lui, s'est chargé des problèmes spécifiques de l'arthroplastie totale chez l'enfant et chez l'adolescent.

Toutes ces expériences, riches d'enseignement, sont celles de chirurgiens qui viennent éclairer par leurs connaissances spécifiques, les problèmes posés par l'arthroplastie totale de la hanche chez les sujets de moins de 50 ans.

Book review (contd. from p. 216)

Analyse de livre (suite de la p.216)

Eur J Orthop Surg Traumatol (1996) 6 : 236

Actualités en biomatériaux, vol III

D. Mainard, M. Merle, J.P. Delagoutte, J.P. Louis (1996) Romillat, Paris, 543 p., 425 FF (ISBN 2-87894-029-6)

Cet ouvrage collectif contient les travaux présentés aux maintenant célèbres Journées de Nancy, de l'Institut Européen des Biomatériaux et de Microchirurgie, lors de leur IVème session. Le premier chapitre est consacré aux traitements de surface prothétique en dehors de l'hydroxyapatite, le deuxième à l'hydroxyapatite, le troisième aux ciments chirurgicaux, le quatrième au contact entre os, articulations et les biomatériaux, les suivants aux problèmes odontologiques et un dernier à des problèmes viscéraux.

Il est impossible, s'agissant d'un livre de congrès, de détailler chaque article. L'on est frappé par l'actualité des sujets traités, par la densité des informations fournies, la qualité de l'iconographie. Petites critiques : l'on aurait aimé disposer d'un index des termes

principaux afin de pouvoir plus rapidement entrer dans un sujet d'intérêt ; de même, les noms des auteurs ne sont pas retrouvés dans la table des matières mais seulement listés alphabétiquement ; ceci rend impossible d'entrer dans l'ouvrage à partir d'un auteur. Une table des matières plus classique ou bien la présence d'un index alphabétique avec renvoi à la pagination aurait été utile. Ces petites critiques qui se veulent constructives, n'enlèvent bien entendu rien à la grande qualité de cet ouvrage qui constitue le « state of art » de l'étude des biomatériaux en France.

P. Kehr

(contd./suite p. 240)

Book review (contd. from p. 236)

Analyse de livre (suite de la p. 236)

Eur J Orthop Surg Traumatol (1996) 6 : 240

La main traumatique

M. Merle, G. Dautel (1995) Masson, Paris, 999 FF (ISBN 2-225-84630-8)

Tome 1 : L'Urgence

(1992, 344 pages, 944 figures)

Tome 2 : Chirurgie secondaire - Le poignet traumatique

(1995, 459 pages, 1090 figures)

La main traumatique est un des chapitres essentiels de la chirurgie de la main. Michel Merle et Gilles Dautel rapportent dans ces deux ouvrages la solide expérience de l'Ecole Nancéienne.

Le premier tome est consacré à l'urgence. Le plan de l'ouvrage révèle le souci d'une grande précision ; rien n'est laissé au hasard. Les premiers chapitres traitent de l'anesthésie, de l'instrumentation, du plateau technique, du bilan lésionnel et de la stratégie. Dès lors, on peut aborder les différentes lésions. Les chapitres suivants développent la pathologie ostéo-articulaire : les entorses, les luxations des doigts, les fractures des métacarpiens et des phalanges. On retrouve ici regroupé et décrit avec précision l'ensemble des différentes méthodes actuellement à notre disposition ; les plus classiques tout comme les plus innovatrices. Les indications sont clairement précisées.

Un chapitre essentiel est consacré à la revascularisation, sujet moins spectaculaire que la réimplantation, mais qui est d'un intérêt majeur en traumatologie de la main.

Les techniques de couverture cutanée sont décrites avec rigueur. L'iconographie est abondante et démonstrative. Les techniques proposées permettent de résoudre aussi bien les problèmes digitaux les plus complexes que les grandes pertes de substance de la main.

Le chapitre des lésions des tendons fléchisseurs et extenseurs est traité avec un soin tout particulier. L'examen clinique, la réparation et aussi les soins post-opératoires sont précisés afin d'éviter les écueils si nombreux dans cette chirurgie apparemment simple, mais en fait complexe et exigeante.

Dans le chapitre des amputations, les auteurs insistent avec justesse sur une notion mal connue, l'amputation d'attente. Il ne s'agit pas de l'urgence différée, mais de la réparation secondaire programmée en urgence.

Après un excellent chapitre consacré à la pathologie unguéale, les auteurs développent le traitement des plaies des nerfs et les replantations. La maîtrise microchirurgicale est l'élément clé de ces chapitres, de précieux conseils, fruits de leur très grande expérience dans ce domaine, intéresseront les lecteurs.

Le chapitre consacré aux doigts-banques est partie intégrante d'une stratégie chirurgicale établie en urgence : c'est l'exploitation ultime des segments ne pouvant être revascularisés. C'est en urgence que la redistribution des fragments tissulaires trouve toutes ses meilleures indications.

Les auteurs terminent ce premier tome en rappelant avec justesse que le succès de l'intervention ne tient pas au seul acte opératoire ; le pansement, les soins post-opératoires et aussi la rééducation sont le complément indispensable de cette chirurgie.

Le tome II comporte deux parties bien différentes, l'une étant consacrée à la chirurgie secondaire de la main traumatique et l'autre au poignet traumatique.

Dans la situation de chirurgie secondaire, plus encore qu'en urgence, il ne peut y avoir de place pour l'improvisation, il convient d'être rigoureux dans les indications et la réalisation technique. Le chapitre consacré à la réparation des cals vicieux, malheureusement trop souvent théorique, est ici riche d'informations pratiques pour la réalisation et la stabilisation des ostéotomies.

Le chapitre consacré aux réparations articulaires traite entre autres de l'arthroplastie de l'articulation interphalangienne proximale par prothèse ou des transferts d'unités articulaires vascularisées et laisse entrevoir des progrès réels. Cependant, les techniques plus anciennes comme l'implant de Swanson et l'arthrodèse restent d'actualité.

Les réparations secondaires des tendons fléchisseurs et extenseurs sont abondamment illustrées et les indications et les soins post-opératoires sont clairs et précis. Ce chapitre et celui consacré aux raideurs digitales détaillent les protocoles adoptés par l'Ecole Nancéienne.

La chirurgie nerveuse secondaire est minutieusement détaillée. Après un rappel des techniques classiques, on trouvera toutes les informations sur les techniques d'avant-garde tel le procédé de De Medinaceli et les greffons nerveux vascularisés. Le chapitre de la chirurgie palliative est le reflet d'une grande compétence des auteurs dans ce domaine ; plus qu'un simple catalogue, on trouve ici une conduite à tenir cohérente et avec beaucoup de conseils précieux.

La reconstruction du pouce fait l'objet d'un important chapitre complet et précis ; tout est détaillé qu'il s'agisse de techniques classiques, de la pollicisation de l'index ou de l'annulaire ou de transferts microchirurgicaux composites ou totaux. Il se termine par un récapitulatif très utile des critères décisifs pour le choix des indications. Tout aussi brillant est le chapitre suivant consacré aux reconstructions digitales et des grandes mutilations de la main.

La deuxième partie du second volume traite du Poignet Traumatique. Les lésions de l'extrémité inférieure du radius et les fractures des os du carpe sont bien décrites. Les méthodes thérapeutiques et les indications sont précises. Le chapitre consacré aux lésions - encore très discutées aujourd'hui - des ligaments est particulièrement clair. On y retrouve le fruit d'une vaste expérience de l'arthroscopie du poignet. Les principales lésions ainsi que les procédés de réparation directe sont présents avec une bonne illustration.

Les auteurs ont consacré une place importante aux techniques palliatives pour traiter les lésions dégénératives évoluées. Les auteurs rapportent leurs choix techniques avec beaucoup de détails et de conseils pratiques tout en précisant la limite de leurs indications.

Bien sûr, les complications, et tout particulièrement l'algoneurodystrophie, sont abordées à la fin de cet ouvrage.

Ces deux volumes constituent une véritable somme sur un vaste sujet de la chirurgie de la main que l'Ecole Nancéienne maîtrise parfaitement. Tous les aspects y sont envisagés et avec précision.

L'expérience des auteurs a permis de présenter avec cohérence et détails leurs choix techniques de telle manière que le lecteur aimera à consulter à tout moment chacun des volumes, soit rapidement pour préciser un petit détail, soit tranquillement pour s'en imprégner progressivement.

Voici deux volumes consacrés à la Main et au Poignet Traumatiques qui méritent une place privilégiée dans toute bibliothèque d'un service, d'une équipe ou d'un chirurgien.

F. Schernberg

(contd./suite p. 254)

Analyse des Conférences d'enseignement 1995 de la SO.F.C.O.T.

Cahier d'enseignement n° 52

Expansion Scientifique Française, Paris (1995) 235 p., nbr ill., FF 820 (ISBN 2-7046-1487-3)

Plusieurs grands classiques et de l'orthopédie et de la traumatologie sont abordés dans cet ouvrage. Les quatre premiers travaux concernent l'arthroplastie totale de hanche.

M.J. Chmell et R. Poss du Département de Chirurgie Orthopédique de Boston analysent les avantages et les désavantages de la modularité des prothèses totales de hanche. La modularité impose certaines contraintes de dessins, qui peuvent affecter indirectement la longévité prothétique. L'usinage et l'assemblage imparfait des jonctions peut également être source de particules d'usure. Il apparaît également que de nombreux facteurs peuvent être à l'origine de sollicitations excessives du polyéthylène d'une prothèse totale de hanche et que la modularité est l'un d'entre eux, en particulier la présence d'un insert métallique qui diminue d'autant l'épaisseur du polyéthylène ainsi que la présence de trous éventuellement dans cet insert, qui peut mettre en contact le polyéthylène directement avec l'os.

J. Witvoet fait une critique des méthodes d'évaluation de la chirurgie prothétique de la hanche. Ce travail, très ardu, insiste sur la comparaison des différentes classifications, en particulier sur la place respective de la douleur, de la mobilité des activités fonctionnelles dont les pourcentages d'influence sont variables selon les classifications. Il insiste également sur l'importance à donner à l'évaluation par le patient en utilisant des échelles d'évaluation visuelle, sur la nécessité de revoir les patients opérés de PTH annuellement, de bien noter l'état clinique, en particulier la douleur et la fonction. Tout résultat doit comporter une table de survie et il souhaite qu'un fichier national de toutes les PTH soit progressivement mis en place, de préférence par la SO.F.C.O.T. et les orthopédistes, plutôt que de leur être imposé par un organisme externe.

H. Olivier étudie le traitement des détériorations cotyloïdiennes aseptiques des prothèses totales de hanche. Les modalités thérapeutiques dépendent de l'importance et de la nature des lésions osseuses. Le choix de l'auteur est de mettre un cotyle scellé ou un cotyle impacté sans greffe osseuse lorsqu'il s'agit d'un descellement sans lésion osseuse importante, d'ajouter des greffons osseux morcelés et un scellement itératif direct de l'implant sur les greffons lorsqu'il existe des lésions osseuses de type cavitaire ; de mettre des greffons osseux morcelés et des greffons structuro-vissés si la perte de substance segmentaire est supérieure ou postérieure sans utiliser systématiquement d'anneau de soutien dans ce cas et, enfin, d'utiliser un anneau vissé dans le toit et la corne postérieure ainsi qu'un cotyle scellé lorsque le descellement se fait avec perte de substance osseuse importante ou fracture transversale du cotyle.

N. Passuti étudie l'ostéo-conduction et l'ostéo-induction à la surface des prothèses. Il rapporte que les études expérimentales démontrent à court et moyen terme la qualité histologique et mécanique de la repousse osseuse lorsqu'un traitement de surface par céramique en phosphate de calcium par technique type torche à plasma a été réalisée. Il rappelle également que l'ostéo-intégration d'une structure métallique avec effet de surface (rugosité ou macroporosité) aboutit à un pourcentage élevé de tissu fibreux associé à un tissu osseux plus ou moins différencié. En site stable, comme cela est le cas pour un cotyle hémisphérique impacté, on peut obtenir une stabilité secondaire

satisfaisante. En revanche, en zone fémorale, les micro-mouvements précoces et les contraintes en cisaillement vont induire une ostéo-fibro-intégration qui demeure une interface fragile, source de déplacements secondaires potentiels. L'ostéo-conduction est un concept actuellement validé du fait de la création d'une zone superficielle de céramique en phosphate de calcium, qui permet très précocement des mécanismes physico-chimiques avec apparition d'apatite biologique et donc de mécanismes de minéralisation et d'ostéo-intégration. L'amélioration des conditions précoces de la fixation dans les cas difficiles pourra se faire à terme par des protéines d'induction quand un certain nombre d'expérimentations auront été réalisées pour préciser les données biologiques fondamentales.

Le cinquième travail fait par M. Mathieu concerne les prothèses totales de genou infectées. Il rappelle que le taux de prothèses de genou infectées bien que faible reste supérieur à celui d'une arthroplastie totale de hanche ; que le germe doit être isolé par des ponctions répétées si nécessaire ; que tout traitement antibiotique aveugle est à proscrire en-dehors des cas d'urgence. Le traitement visé à la restitution d'une articulation fonctionnelle, qui va être possible par une réimplantation en un ou en deux temps. Ceci n'est pas toujours possible. Il faut parfois passer à l'arthrodèse, à la résection ou à l'amputation. Il rappelle également les grands principes qui devraient toujours être respectés en cas d'arthroplastie en général et de genou en particulier à savoir, préparation du malade en éradiquant tout foyer infectieux avant l'intervention, antibioprophylaxie, traitement énergique de toute infection intercurrente après l'intervention.

J.L. Husson fait une étude de l'instabilité vertébrale à l'étage lombaire. Il préfère la notion de dysfonctionnement intervertébral acquis (DIVA). Celui-ci comporte quatre stades : le stade 0 de dysfonctionnement minime correspondant à la phase initiale de déformation élastique, le stade I de dysfonctionnement mineur correspondant à la phase d'état de la déformation élastique avec perte de stabilité pure donnant un syndrome lombalgique à type de blocage articulaire postérieur furtif, le stade II de dysfonctionnement majeur correspondant à la phase évoluée de déformation élastique avec poursuite évolutive dynamique de la perte de stabilité entraînant une sténose d'abord dynamique seule avec lombosciatique, ensuite intervient la phase évolutive de déformation plastique par perte de l'hydraulique générant une sténose permanente latérale. Enfin le stade III de dysfonctionnement maximal correspondant à la phase évolutive ultime avec restauration secondaire ou apparition d'un pseudo-spondylolisthésis dégénératif de Junghanns ou d'une dislocation rotatoire.

J. Caton traite de l'allongement des membres chez les adolescents et les adultes jeunes. Il insiste sur le fait que le choix d'une technique d'allongement n'est pas seulement une affaire d'habitude et qu'il faut se garder de tout dogmatisme et de tout totalitarisme, la meilleure technique étant celle que l'on possède le mieux, dont on a le plus l'habitude. Il remet en cause, la corticotomie d'Illizarov pour dire que la règle d'aujourd'hui c'est le respect du périoste. Il insiste également sur le fait qu'il faut être méticuleux et attentif, car le suivi est important, « on n'allonge pas une radiographie, mais un patient ».

Analyse des Conférences d'enseignement 1995 de la S.O.F.C.O.T.

Cahier d'enseignement n° 52

Expansion Scientifique Française, Paris (1995) 235 p., nbr ill., FF 820 (ISBN 2-7046-1487-3)

(suite de la p. 254)

D. Le Viet étudie la rhizarthrose du pouce. Le traitement est essentiellement un traitement médical qui permet à la grande majorité des patients d'évoluer vers l'indolence au prix d'un enraidissement modéré et bien toléré. Ce ne sont que les douleurs rebelles aux différents traitements médicaux qui devront conduire le patient à une éventuelle indication chirurgicale. Les techniques chirurgicales sont variées et aucune n'est parfaite.

Ch. Gerber étudie l'instabilité antérieure chronique de l'épaule. Leur diagnostic est devenu extrêmement fiable par les progrès de la séméiologie, mais aussi surtout de l'imagerie. C'est l'adhésion du ligament gléno-huméral inférieur qui paraît être la lésion essentielle dans la grande majorité des cas. Les modalités de traitement sont innombrables. Les méthodes arthroscopiques deviennent de plus en plus performantes et paraissent de plus en plus écarter les méthodes de chirurgie classique. Devant la multitude des possibilités de traitement, la panacée de techniques opératoires, d'instruments et implants disponibles, le chirurgien n'est plus capable d'avoir des connaissances exactes de tous les détails. Il ne faut pas se laisser tenter à participer à chaque nouvelle mode, mais se réorienter vers les bases anatomiques, anatomo-physiologiques et les appliquer logiquement.

Ph. Neyret étudie les fractures de la rotule. Le traitement orthopédique est préféré et indiqué pour les fractures longitudinales avec peu d'écart ou transversales sans retentissement articulaire. Le traitement chirurgical comporte le haubanage, le cerclage, l'ostéosynthèse par fil métallique en 8, l'ostéosynthèse par vis, la patellectomie partielle et enfin la patellectomie totale. Les techniques moins classiques comme les sutures percutanées ou le vissage percutané sont également présentées. Les complications et leur prise en charge terminent là le travail.

Th. Judet étudie la pathologie traumatique du rachis cervical supérieur. Après une analyse des lésions, il expose les méthodes classiques de traitement. La bibliographie est peut-être un peu courte, en particulier les importants travaux de F. Magerl ont été omis.

Ph. Chiron étudie les fractures récentes de l'extrémité inférieure du fémur de l'adulte dont le traitement doit préférentiellement être chirurgical, le traitement orthopédique étant l'exception. Il rappelle les principes de base, à savoir une bonne réduction indispensable, le parage des fractures ouvertes qui ne doit pas être différé alors que l'ostéosynthèse peut l'être, la rééducation passive qui doit commencer dès le premier jour opératoire.

A. Kaelin traite du kyste essentiel des os dont il rappelle la bénignité et la situation principalement au niveau des métaphyses proximales, humérales et fémorales. Seule l'évolution naturelle consiste en une phase d'expansion, puis de régression spontanée, les fractures pathologiques ne se produisant que lorsque les parois sont fragilisées par la grande taille du kyste. Des rapports préliminaires démontrent l'efficacité de l'injection de moelle osseuse autologue, qui provoque l'ossification des kystes de façon reproductible, quel que soit le stade d'évolution. Il met beaucoup d'espoir dans la Bone Morphogenic Protein humaine, qui offrira peut-être dans l'avenir la solution thérapeutique rapide et sûre des kystes osseux solitaires.

J.L. Tassin fait le traitement orthopédique des scolioses idiopathiques, en insistant sur les scolioses juvéniles et de l'adolescence. Il rappelle les différents types de scoliose et les principaux types de plâtres et de corsets. Il estime que le traitement orthopédique garde une place importante malgré les progrès spectaculaires de la chirurgie, car aux deux extrêmes de la vie, la chirurgie n'est pas possible. Chez le grand enfant et chez l'adolescent pour les déformations encore modérées, mais évolutives, le traitement orthopédique maintient huit fois sur dix la déformation dans des limites acceptables, tout en conservant la souplesse du rachis.

C. Garin traite de l'instabilité rotulienne chez l'enfant. Il propose une classification basée sur la luxation avec dysplasie luxante majeure et luxation occasionnelle, luxation potentielle et syndrome douloureux rotulien. La réaxation du système extenseur par stabilisation distale reste le geste de base comme chez l'adulte. La réalisation peut être faite chez l'enfant grâce à l'artifice ligamento-périosté.

Enfin, Cl. Karger termine le cahier par les épiphysiodèses chirurgicales, techniques, indications et résultats. Les indications sont les inégalités de longueur des membres inférieurs d'une part, les déviations angulaires d'autre part. Une étude précise des courbes de croissance est nécessaire pour poser correctement l'indication. Les épiphysiodèses thérapeutiques sont utilisées aux plus de 60 ans et résistent à l'épreuve du temps. Le geste est facile, sa morbidité faible, l'hospitalisation courte. L'agrafage selon Blount tend à être remplacé par des techniques percutanées.

P. Kehr

Examination of the hand and wrist

R. Tubiana, J.M. Thominé, E. Mackin (1996) M. Dunitz, London. 408 p., 500 sketches, photographs and radiographies

With this second edition of the examination of the hand and wrist, Raoul Tubiana, Jean-Michel Thominé and Evelyn Mackin offer us a tool of work of an exceptional quality.

This 408 pages book, illustrated with 500 sketches, due in part to J.W. Littler and to A. Kapandji, gives the opportunity to have a thorough knowledge of the functional anatomy of the hand, the semeiology, the basic examinations to perform by imaging (conventional radiography, scanner, MRI, arteriography). This important work has the merit of being clear and precise. The anatomical descriptions are always done with the aim of privileging the knowledge of the function and of making the reader more sensitive to understanding the deformities. The surgeon will find in each chapter not only the most tiny references on each anatomic structure which have an interest in his surgical practice but also a detailed semeiology which will lead him to a precise diagnosis without having to ask for complementary examinations.

The reader will be impressed by the quality of the chapter dedicated to the study of the function of the hand and wrist which will be of interest also to our neurologists and rheumatologists colleagues in the explanation of the deformities of the digital chains during the neurological, rheumatismal and rheumatoid affections.

The authors took care in reminding us of the different classifications or nomenclatures useful for the evaluation of function of the thumb, the flexor tendons, Dupuytren's disease, etc... The results are also presented in the classifications recognized by the International Community.

The chapter dedicated to the examination of the peripheral nervous system is also of great quality due to its semeiological richness and the study of the pathophysiology of the deformities after paralysis. It is indispensable to know them in order to master the techniques of tendon transfers.

The bibliography is abundant and at the same time pertinent and current as it includes the latest publications of the years 1994-1995. The chapter dedicated to the imaging may appear somewhat unbalanced through its small development within this work but it is essentially dedicated to imaging the wrist with choices specific to the author.

Overall, this is an exceptionally rich work on the anatomophysiological and semeiological levels, richly illustrated by J.W. Littler and A. Kapandji and which is the fruit of a very important experience of the authors. Every G.P., surgeon, physiotherapist will find in this work the required information in order to better grasp the anatomical organization of the hand, its function, its semeiology and the physiopathogeny of the deformities. This is a book which must from now on be considered as the reference on the subject.

Par cette seconde édition de l'examen de la main et du poignet, Raoul Tubiana, Jean-Michel Thominé et Evelyn Mackin nous apportent un outil de travail d'une qualité exceptionnelle.

Ce volume de 408 pages, illustré de 500 dessins, que l'on doit en partie à J.W. Littler et A. Kapandji, permet de connaître dans ses moindres détails l'anatomie fonctionnelle de la main, la séméiologie, les examens de base à effectuer par imagerie (radiographie conventionnelle, scanner, IRM, artériographie). Cet important travail a le mérite de la clarté et de la précision. Les descriptions anatomiques sont toujours effectuées dans le but de privilégier la connaissance de la fonction et de mieux sensibiliser le lecteur à la compréhension des déformations. Le chirurgien trouvera dans chacun des chapitres non seulement les plus infimes références sur chaque structure anatomique qui ont un intérêt dans sa pratique chirurgicale mais également une séméiologie détaillée qui le conduira à un diagnostic précis sans recourir à de multiples examens complémentaires.

Le lecteur sera impressionné par la qualité du chapitre consacré à l'étude de la fonction de la main et du poignet qui ne manquera pas d'intéresser également nos collègues neurologues et rhumatologues dans l'explication des déformations des chaînes digitales au cours des affections neurologiques, rhumatismales et rhumatoïdes.

Les auteurs ont pris soin de rappeler les différentes classifications ou nomenclatures utiles pour l'évaluation de la fonction du pouce, des tendons fléchisseurs, de la maladie de Dupuytren, etc... Les résultats sont également présentés sous forme de classifications toutes reconnues par la Communauté Internationale.

La chapitre consacré à l'examen du système nerveux périphérique est également d'une grande qualité par sa richesse séméiologique et l'étude de la physiopathogénie des déformations après paralysie. Elles sont indispensables à connaître pour maîtriser les techniques de transferts tendineux.

La bibliographie est abondante tout en étant pertinente et actuelle puisqu'elle contient les dernières publications des années 1994-1995. Le chapitre consacré à l'imagerie pourra apparaître déséquilibré par son peu de développement au sein de cet ouvrage mais il est surtout dédié à l'imagerie du poignet avec des choix qui sont propres à son auteur.

Au total, il s'agit d'un ouvrage d'une exceptionnelle richesse sur le plan anatomophysologique et séméiologique, richement illustré par J.W. Littler et A. Kapandji et qui est le fruit d'une très importante expérience des auteurs. Tout médecin, chirurgien, appareilleur, rééducateur trouvera dans cet ouvrage l'information qu'il recherchera pour mieux saisir l'organisation anatomique de la main, sa fonction, sa séméiologie et la physiopathogénie des déformations. C'est un livre qui doit désormais être considéré comme la référence sur le sujet.

- bits. *J Bone Joint Surg [Am]* 58-A: 854-858
16. Friedlaender GE, Strong DM, Sell KW (1984) Studies on the antigenicity of bone. II. Donor specific anti-HLA antibodies in human recipients of freeze-dried allografts. *J Bone Joint Surg [Am]* 66-A: 107-112
17. Gérard Y (1988) Banque d'os : introduction. *Rev Chir Orthop* 74: 110-111
18. Gross AE, Lavoie MV, McDermott P, Marks P (1985) The use of allograft bone in revision of total hip arthroplasty. *Clin Orthop* 197: 115-122
19. Hedde C (1988) La réparation des lésions cotyloidiennes par allogreffe de tête fémorale de banque. *Rev Chir Orthop* 74:120-122
20. Hernigou P (1988) Conservation des allogreffes osseuses. *Rev Chir Orthop* 74:114-116
21. Hernigou P, Delépine G, Goutallier D (1986) Allogreffes massives cryopréservées et stérilisées par irradiation. *Rev Chir Orthop* 72: 267-276
22. Hernigou P (1988) Evolution des allogreffes massives. *Rev Chir Orthop* 74: 131-134
23. Hutten D (1988) Utilisation des allogreffes osseuses dans les reconstructions fémorales au cours des reprises de prothèse totale de hanche. *Rev Chir Orthop* 74: 122-124
24. Jofe MH, Gebhardt MC, Tomford WW, Mankin HJ (1990) Reconstruction for defects of the proximal part of the femur using allograft arthroplasty. *J Bone Joint Surg [Am]* 70-A: 507-516
25. Loty B (1988) Irradiation des allogreffes osseuses. *Rev Chir Orthop* 74: 116-117
26. Loty B (1988) Allogreffes osseuses massives. *Rev Chir Orthop* 74: 127-131
27. Mankin HJ, Doppelt S, Tomford W (1983) Clinical experience with allograft implantation: the first ten years. *Clin Orthop* 174: 69-86
28. Merle d'Aubigné R, Méary R, Thomine JM (1966) La résection dans le traitement des tumeurs des os. *Rev Chir Orthop* 52: 305-324
29. Musculo DL, Caletti E, Schajowicz F, Araujo ES, Mkino A (1987) Tissue-typing in human massive allografts of frozen bone. *J Bone Joint Surg [Am]* 69-A: 583-595
30. Ottolenghi CE (1972) Massive osteo and osteo-articular bone grafts: technic and results of 62 cases. *Clin Orthop* 87: 156-164
31. Pellicci PM, Wilson PD Jr, Sledge CB, Salvati EA, Ranawat CS, Poss R, Callaghan JJ (1985) Long-term results of revision total hip replacement. A follow-up report. *J Bone Joint Surg [Am]* 67-A: 513-516
32. Petty W, Goldsmith S (1980) Resection arthroplasty following infected total hip arthroplasty. *J Bone Joint Surg [Am]* 62-A: 889-896
33. Poitout D, Novakovich G (1987) Utilisation des allogreffes en oncologie et en traumatologie. *Int Orthop* 11: 169-178
34. Poitout D (1988) Biologie des allogreffes osseuses. *Rev Chir Orthop* 74: 112-114
35. Poitout D (1988) Indications classiques des allogreffes osseuses. *Rev Chir Orthop* 74: 118-119
36. Poitout D, Gaujoux G, Lempidakis M (1990) Reconstructions iliaques totales ou partielles à l'aide d'allogreffes de banque. *Int Orthop* 14: 111-119
37. Poitout D, Lempidakis M, Loncle X (1991) Allogreffes otéo-cartilagineuses massives dans le traitement des nécroses ou des pertes de substance articulaires. *Chirurgie* 117: 193-198
38. Sim FH, Chao EYS (1981) Hip salvage by proximal femoral replacement. *J Bone Joint Surg [Am]* 63-A: 1228-1239
39. Stevenson S, Horowitz M (1989) Current concepts review. The response to bone allografts. *J Bone Joint Surg [Am]* 71-A: 1297-1307
40. Wilson PD Jr, Aglietti P, Salvati EA (1974) Subacute sepsis of the hip treated by antibiotics and cemented prosthesis. *J Bone Joint Surg [Am]* 56-A: 879-898
41. Wroblewski BM (1986) One-stage revision of infected cemented total hip arthroplasty. *Clin Orthop* 211: 103-107

Reçu le 1er avril 1996 / Accepté après modifications le 1er août 1996

Book review (contd. from p. 270)

Analyse de livre (suite de la p. 270)

Eur J Orthop Surg Traumatol (1996) 6 : 277

Neuroradiologie - 650 images clés

A. Wackenheim, Ph. Castan, N. Leboucq (1996) Sauramps Médical, Montpellier

Le concept d'images clés médicales a fait son chemin dans l'esprit des imagiers. Les auteurs de cet ouvrage ont constitué une véritable banque de données sémiotiques qui sont en fait des images référentielles, typiques, caractéristiques, spécifiques ou pathognomoniques, des parangons sémiotiques. Ces images sont réparties en dix chapitres qui traversent toute la pathologie du système nerveux ; toutes les méthodes d'imagerie traditionnelles ou très modernes ont été utilisées pour extraire les images clés très synthétiques, qu'il s'agisse d'angiographie, de TDM, d'IRM... L'image clé, on le sait, s'attache le plus souvent à une technique particulière. Ces images sont faciles à percevoir et, de ce fait, faciles à mémoriser. Ce sont des images réduction, images-souvenirs.

L'index de cet ouvrage est très abondant et fait de cette banque d'images un outil de travail facile à consulter. Les légendes sont trilingues.

Chaque chapitre est présenté par une personnalité médicale particulièrement compétente : J.Cl. Dosch, P. Bourjat, R. Beaujeux, J.M. Caillé, D. Doyon, J. Vignaud, J.L. Dietemann et A. Coussement.

Le travail a été piloté par l'Université de Strasbourg et le service de Neuroradiologie de Montpellier.

Cet ouvrage sera édité fin 1996 chez Sauramps Médical à Montpellier.

A. Wackenheim