Erratum

Wedler S, et al.:

Treatment Outcome in Angle Class II, Division 1 Patients in Pre-puberty and Puberty after
Jumping-the-Bite Appliance

Zum Behandlungseffekt bei der Therapie von Kindern mit Angle-II,1-Okklusion mit der Doppel-
Vorschubplatte in der vorpubertären und in der pubertären Phase

(J Orofac Orthop 2006;67:105–15 [No. 2] DOI 10.007/s00056-006-4041-8)

There were terminological errors in both the English and German legends of Figure 2. Please note the corrected version:

Die englische und die deutsche Legende der Abbildung 2 enthielten terminologische Fehler. Im Folgenden geben wir die korrekte Fassung wieder:

Figure 2. Tracing of lateral cephalogram, landmarks: nasion (N); sella (S); condyion (Cond); articulare (Ar); constructed mandibular angle (tgo); menton (Me); gnathion (Gn); pogonion (Pog); suprapogonion (Pm); B-point (B), posterior nasal spine (PNS); anterior nasal spine (ANS); intersection of nasal line (Sp); A-point (A); apex point of upper central incisor (Ap1up); *incision superius* of the upper central incisor (Is1up); *incision inferius* of the lower central incisor (Is1lo); apex point of the lower central incisor (Ap1lo); posterior point of the occlusal plane (pPOcP).

Abbildung 2. FRS mit Durchzeichnung, Bezugspunkte: Nasion (N); Sella (S); Condyion (Cond); Articulare (Ar); Konstruierter Kieferwinkel (tgo); Menton (Me); Gnathion (Gn); Pogonion (Pog); Suprapogonion (Pm); B-Punkt (B); Spina nasalis posterior (PNS); Spina nasalis anterior (ANS); Schnittpunkt des Spina-Planums (Sp); A-Punkt (A); Apicale des oberen mittleren Schneidezahnes (Ap1up); *Incision superius* des oberen mittleren Schneidezahnes (Is1up); *Incision inferius* des unteren mittleren Schneidezahnes (Is1lo); Apicale des unteren mittleren Schneidezahnes (Ap1lo); Hinterer Punkt des Okklusionsplanums (pPOcP).