Erratum

Herz 2009;34:298

DOI 10.1007/s00059-009-3256-z

Wie nützlich sind die Algorithmen zur Differentialdiagnostik der monomorphen Tachykardien mit breitem QRS Komplex in kardiologischen Notfällen?

How Useful Are the Algorithms for the Differential Diagnosis of the Monomorphic Tachycardias with Broad QRS Complex in Cardiac Emergencies?

Ewald Himmrich, Klaus Kettering, Thomas Münzel¹

¹II. Medizinische
Klinik und Poliklinik,
Universitätsmedizin
der Johannes Guten-
berg-Universität
Mainz.

Erratum zu: HERZ 2009;33:176–95
DOI 10.1007/s00059-009-3218-5

Published online: 15 May 2009

Korrespondenz- anschrift

Prof. Dr. Ewald
Himmrich
II. Medizinische
Klinik und Poliklinik
Universitätsmedizin
der Johannes Guten-
berg-Universität
Mainz
Langenbeckstraße 1
55131 Mainz
Telefon (+49/6131)
17-7265, Fax -6603
E-Mail: himmrich@
2-med.klinik.uni-
mainz.de

Den Autoren ist unglücklicherweise in Abbildung 8 auf Seite 182 ein Fehler unterlaufen. Sie möchten folgende Korrekturen anbringen (Änderungen in Fettschrift):

Intervall R/Spitze S < 100 ms in V5, daher formal SVT nach Brugada-Algorithmus. Anstieg der Amplitude in den ersten 40 ms (Vi) um 0,2 mV. Anstieg der Amplitude in den letzten 40 ms (Vt) um **0,3 mV**. Vi/Vt < 1, daher formal VT nach Vereckei-Algorithmus.