Stellungnahme

Die Autoren des Beitrags, Thomas Wilhelm, Christian Güldner, Thomas Günzel und Susanne Wiegand nehmen dazu wie folgt Stellung.

Zunächst möchten wir Herrn Prof. Dr. med. Boris A. Stuck aus der Mannheimer Universitäts-HNO-Klinik für die Anmerkungen zur Therapie des Adenoid-Syndroms mit kortikosteroidhaltigen Nasensprays danken. Sie erfordern allerdings einige Kommentare.

Der Einschätzung „Zur Überlegenheit einer rein konservativen Therapie liegen keine evidenzbasierten Studien vor“ sowie „Eine prätherapeutische Therapie mit topischen Kortikosteroiden konnte bisher keinen Nutzen nachweisen“ im Artikel liegt eine systematische Metaanalyse zugrunde, auf die im Text referenziert wird [1]. In dieser Metaanalyse werden die von Herrn Professor Stuck zitierten Arbeiten [2–6] aufgearbeitet: Auch wenn in vier von fünf Studien [2–5] signifikante Verbesserungen der Symptomscores (behinderte Nasenatmung) oder Verkleinerungen des adenoiden Gewebes sichtbar waren sowie in einer Studie [6] aufgrund der geringen Fallzahl keine signifikante Veränderung messbar war (obwohl sich das Ausmaß des adenoiden „Polsters“ um 4/5 reduziert hatte), kommen Zhang et al. zu dem Schluss, dass eine „limitierte Evidenz suggeriere, dass intranasale Kortikosteroide die Symptome nasaler Obstruktion bei Kindern mit moderater bis ausgeprägter adenoider Hypertrophie signifikant verbessere und dass diese Verbesserung bedingt sei durch eine Verkleinerung des adenoiden Gewebes.“

Insbesondere hinsichtlich der möglichen Nebenwirkungen bei einer Langzeitanwendung (die im Übrigen nicht ausreichend untersucht wurde: lediglich eine Studie [4] hatte einen Untersuchungszeitraum von knapp zwei Jahren) liegen keine Daten vor, und die Frage einer Nebennierenrindeninsuffizienz oder etwaiger Wachstumsretardierungen bei Langzeitanwendung nasaler Kortikosteroid-Sprays ist nach wie vor fraglich. In der Studie mit Langzeitanwendung [4] war schließlich noch bei 13 von 24 Kindern (54 %) die operative Intervention im Sinne einer Adenotomie erforderlich.

Weiter folgern Zhang et al. nach Analyse der vorliegenden Studien, dass zahlreiche methodische Mängel vorliegen, die die Evidenzstärke beeinträchtigen (Randomisationsmethode nicht beschrieben, keine Fallzahlab-schätzungen, keine Intention-to-treat-Analyse, kein standardisiertes Reporting und daher keine Datensynthese möglich). Daher kann keine generelle Empfehlung zum Einsatz kortikosteroidhaltiger Nasensprays bei der adenoiden Hypertrophie gegeben werden, sondern sie werden als „alternative Therapie bei Kindern mit moderater bis ausgeprägter Adenoidhyperplasie empfohlen, wenn eine Adenotomie nicht dringend erforderlich oder verfügbar ist.“ Als Schlussfolgerung werden weitere große und qualitativ hochwertige Studien mit standardisierter Berichterstattung gemäß CONSORT-Kriterien [7] und bei Cross-over-Studien ausreichender Wash-out-Periode gefordert.

Die weiteren von Herrn Professor Stuck angeführten Arbeiten [8–11] resultieren alle aus einer Arbeitsgruppe, die sich ei-

nerseits mit dem synthetischen Glukokortikoid Budesonid sowie andererseits mit dem Leukotrien-Rezeptorantagonisten Montelukast zur Symptomverbesserung schlafbezogener Atemstörung bei Kindern beschäftigen. Anzumerken ist, dass hier die Ergebnisse einer Studie, bestehend aus einer initial offenen Studie [10] sowie einer nachfolgend plazebokontrollierten randomisierten Studie [11], in mehreren Teilen publiziert wurden – die als zusätzliche Studie angegebene Referenz [12] ist ein Posterabstract, der sich wiederum auf die Hauptstudie bezieht [11]. Unabhängig von der „Salami“-Taktik der Publikation von Studienergebnissen haben die Autoren in ihrer Untersuchung an insgesamt 45 Kindern eine Wirksamkeit hinsichtlich der schlafbezogenen Atemstörungen mittels der Polysomnographie nachweisen können. Anzumerken bleibt, dass die Studie in einer pädiatrischen Klinik durchgeführt wurde. Ebenso konnte, ebenfalls in einer Kinderklinik, die Kombination topischer Glukokortikoide (N = 62 [8]) sowie in Kombination mit dem Leukotrienrezeptor-Antagonisten Montelukast (N = 36 [9]) als wirksam hinsichtlich der schlafbezogenen Atemstörungen bei Kindern mit mildem OSAS nachgewiesen werden.

Der genaue Wirkmechanismus sowohl der topischen Glukokortikoide als auch der systemischen Leukotrienrezeptor-Antagonisten ist nach wie vor nicht eindeutig geklärt. Festzuhalten bleibt ferner, dass auch hinsichtlich der Dosierungen bei topischen Glukokortikoiden bisher keine Einigkeit besteht [1] und ebenfalls keinerlei Studien zu den Langzeitwirkungen und vor allem Nebenwirkungen vorliegen. Insofern kann man unseres Erachtens, wie übrigens auch in der von der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie e.V. verabschiedeten und gültigen Leitlinie zur Thematik aufgeführt [13], keine allgemeine Empfehlung zur Therapie bei Adenoid-Syndrom geben.

Unabhängig davon haben die beschriebenen Therapieansätze in den vorgestellten Studien eine Wirksamkeit nachgewiesen, so dass im Einzelfall – beispielsweise bei Kontraindikationen für den chirurgischen Eingriff oder bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten – ein Therapieversuch unter Beachtung und Überwachung der Nebenwirkungen gerechtfertigt erscheint. Weiter ist mit Zhang et al. [1] zu fordern, dass die Wirksamkeit und vor allem Unbedenklichkeit in großen kontrollierten und randomisierten Studien unter Beachtung allgemein gültiger Reportingkriterien nachgewiesen wird.

Dr. med. Thomas Wilhelm
Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-/Hals-
und plastische Gesichtschirurgie
HELIOS Klinikum Borna
Rudolf-Virchow-Straße 2
04552 Borna