2. Battezzati A, Vigano R (2001) Indirect calorimetry and nutritional problems in clinical practice. *Acta Diabetol* 38:1–5
3. Bland JM, Altman DG (1986) Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *Lancet* 1:307–310
4. Burchardi H, Larsen R, Schuster H-P, Suter PM (2004) *Die Intensivmedizin*. Springer, Berlin
5. Cartwright MM (2004) The metabolic response to stress: a case of complex nutrition support management. *Crit Care Nurs Clin North Am* 16:467–487
6. Cereda E, Turrini M, Ciapanna D et al (2007) Assessing energy expenditure in cancer patients: a pilot validation of a new wearable device. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 31:502–507
7. Cerra FB (1987) Hypermetabolism, organ failure, and metabolic support. *Surgery* 101:1–14
8. Da Rocha EE, Alves VG, Da Fonseca RB (2006) Indirect calorimetry: methodology, instruments and clinical application. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 9:247–256
9. Fresenius M, Heck M (2006) *Repetitorium Intensivmedizin*. Springer, Berlin
10. Fruin ML, Rankin JW (2004) Validity of a multi-sensor armband in estimating rest and exercise energy expenditure. *Med Sci Sports Exerc* 36:1063–1069
11. Haugen HA, Chan LN, Li F (2007) Indirect calorimetry: a practical guide for clinicians. *Nutr Clin Pract* 22:377–388
12. Heyland DK, Cook DJ, Guyatt GH (1993) Enteral nutrition in the critically ill patient: a critical review of the evidence. *Intensive Care Med* 19:435–442
13. Malavolti M, Pietrobello A, Dugoni M et al (2007) A new device for measuring resting energy expenditure (REE) in healthy subjects. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 17:338–343
14. Max M (2007) Nutrition of the critical ill. *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 42:592–599
15. McClave SA, McClain CJ, Snider HL (2001) Should indirect calorimetry be used as part of nutritional assessment? *J Clin Gastroenterol* 33:14–19
16. McClave SA, Spain DA, Skolnick JL et al (2003) Achievement of steady state optimizes results when performing indirect calorimetry. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 27:16–20
17. Perez J, Dellinger RP (2001) Other supportive therapies in sepsis. *Intensive Care Med [Suppl 1]* 27:S116–S127
18. Schütz T, Hoffmann I, Lochs H, Pirlich M (2006) Ist das SenseWear-Armband zur Messung des Ruheenergieumsatzes geeignet? *Aktuelle Ernähr Med* 31:139
19. Wooley JA (2006) Indirect calorimetry: applications in practice. *Respir Care Clin N Am* 12:619–633

Anaesthesist 2009 · 58:794
DOI 10.1007/s00101-009-1606-0
© Springer Medizin Verlag 2009

A. Timmermann¹ · C. Byhahn²

¹ Zentrum Anaesthesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin, Universitätsmedizin Göttingen

² Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt

Krikoiddruck

Schützender Handgriff oder etablierter Unfug?

Anaesthesist (2009) 58:663–664

In unserem Editorial zum Krikoiddruck haben sich leider zwei Fehler eingeschlichen. An zwei Stellen im Text sprechen wir vom Druck auf den Schildknorpel, obwohl es natürlich Druck auf den *Ringknorpel* heißen muss.

Bitte beachten Sie, dass es sich beim Krikoiddruck (so wie der Name es bezeichnet) selbstverständlich um den Druck auf das Krikoid, also den Ring- und nicht auf den Schildknorpel handelt.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

A. Timmermann

C. Byhahn

Korrespondenzadresse

PD Dr. A. Timmermann D.E.A.A., M.M.E.

Zentrum Anaesthesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin, Universitätsmedizin Göttingen
Robert-Koch-Str. 40, 37099 Göttingen
atimmer@med.uni-goettingen.de

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter:
<http://dx.doi.org/10.1007/s00101-009-1570-8> finden.