4. Duracher C, Schmautz E, Martinon C et al (2008) Evaluation of cuffed tracheal tube size predicted using the Khine formula in children. *Paediatr Anaesth* 18:113–118
5. Eck JB, De Lisle Dear G, Phillips-Bute BG et al (2002) Prediction of tracheal tube size in children using multiple variables. *Paediatr Anaesth* 12:495–498
6. Eipe N, Barrowman N, Writer H et al (2009) A weight-based formula for tracheal tube size in children. *Paediatr Anaesth* 19:343–348
7. Furuya A, Nomura H, Kuroiwa G et al (2009) Endotracheal tube selection in children: which is the better predictor for the selection, tracheal internal diameter in X-ray photograph or age-based formula? *Masui* 58:724–727
8. Heck M, Fresenius M (2008) *Repetitorium Anästhesiologie*. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio
9. Hofer CK, Ganter M, Tucci M et al (2002) How reliable is length-based determination of body weight and tracheal tube size in the paediatric age group? The Broselow tape reconsidered. *Br J Anaesth* 88: 283–285
10. Holzk J (1997) Laryngeal damage from tracheal intubation. *Paediatr Anaesth* 7:435–437
11. Jöhr M (2002) Die Wahl der Tubusgröße beim Kind. *Anaesthesist* 51:326–327
12. Keep PJ, Manford ML (1974) Endotracheal tube sizes for children. *Anaesthesia* 29:181–185
13. Khine HH, Corddry DH, Kettrick RG et al (1997) Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. *Anesthesiology* 86:627–631
14. King BR, Baker MD, Braitman LE et al (1993) Endotracheal tube selection in children: a comparison of four methods. *Ann Emerg Med* 22:530–534
15. Larsen R (2006) *Anästhesie*, 8. Aufl. Urban & Fischer, München
16. Madler C, Jauch KW, Werdan K et al (2005) *Das NAW-Buch*, 3. Aufl. Urban & Fischer, München
17. Motoyama EK (1990) Endotracheal intubation. In: Motoyama EK (ed) *Smith's anesthesia for infants and children*. Mosby, St. Louis
18. Penlington GN (1974) Endotracheal tube sizes for children. *Anaesthesia* 29:494–495
19. Salgo B, Schmitz A, Henze G et al (2006) Evaluation of a new recommendation for improved cuffed tracheal tube size selection in infants and small children. *Acta Anaesthesiol Scand* 50:557–561
20. Schulte am Esch J, Kochs E, Bause H (2002) *Anästhesie und Intensivmedizin*, 2. Aufl. Thieme, Stuttgart
21. Shih MH, Chung CY, Su BC et al (2008) Accuracy of a new body length-based formula for predicting tracheal tube size in Chinese children. *Chang Gung Med J* 31:276–280
22. Takita K, Morimoto Y, Okamura A et al (2001) Do age-based formulae predict the appropriate endotracheal tube sizes in Japanese children? *J Anesth* 15:145–148
23. Berg AA van den, Mphanza T (1997) Choice of tracheal tube size for children: finger size or age-related formula? *Anaesthesia* 52:701–703
24. Wang TK, Wu RS, Chen C et al (1997) Endotracheal tube size selection guidelines for Chinese children: prospective study of 533 cases. *J Fomos Med Assoc* 96:325–329
25. Weiss M, Dullenkopf A (2007) Cuffed tracheal tubes in children: past, present and future. *Expert Rev Med Devices* 4:73–82
26. Weiss M, Dullenkopf A, Fischer JE et al (2009) Prospective randomized controlled multi-centre trial of cuffed or uncuffed endotracheal tubes in small children. *Br J Anaesth* 103:867–873
27. Woodbridge PD (1951) Formula for estimating size of child's endotracheal tube. *Anesthesiology* 12:255

Anaesthesist 2011 · 60:342
DOI 10.1007/s00101-011-1896-x
© Springer-Verlag 2011

S. Weiterer¹ · D. Störzinger² · M. Bernhard³ · K. Mayer⁴ · C. Lass-Flörl⁵ · M.A. Weigand¹ · C. Lichtenstern¹

¹ Klinik für Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen

² Apotheke, Universitätsklinikum Heidelberg

³ Zentrale Notaufnahme, Klinikum Fulda gAG, Fulda

⁴ Medizinische Klinik und Poliklinik II, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin, Infektiologie, Gastroenterologie, Nephrologie, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen

⁵ Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Department für Hygiene, Mikrobiologie und Sozialmedizin, Medizinische Universität Innsbruck

Erratum zu: Antibiotikatherapie der nosokomialen Pneumonie

Anaesthesist (2011) 60:269–283

<http://dx.doi.org/10.1007/s00101-011-1861-8>

Die Autoren machen darauf aufmerksam, dass im oben genannten Beitrag in **Tab. 5** auf S. 275 in der 13. Zeile eine fehlerhafte Angabe gemacht wurde. Zu den carbapenemaseproduzierenden Enterobakterien muss es heißen:

Rifampicin 1-mal 600–900 mg
(statt Rifampicin 3)

Die Autoren bitten, dies zu entschuldigen und die Korrektur zu berücksichtigen.

Korrespondenzadresse

Dr. C. Lichtenstern

Klinik für Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen
Rudolf-Buchheim Straße 7, 35392 Gießen
christoph.lichtenstern@chiru.med.uni-giessen.de