Literatur

1. Jüttner B (2016) Kohlenmonoxidvergiftung: HBOT empfehlenswert. Anaesthesist. doi:10.1007/s00101-016-0144-9
2. Drinhaus H, Nüsgen S, Hinkelbein J (2016) Notärztliche Tätigkeit im Brandeinsatz. Anaesthesist 65:56–60
3. Buckley NA, Juurlink DN, Isbister G, Bennett MH, Lavonas EJ (2011) Hyperbaric oxygen for carbon monoxide poisoning. Cochrane Database Syst Rev 4:CD002041
4. Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK (2012) Practice recommendations in the diagnosis, management and prevention of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med 186:1095–1101
5. Kaiser G, Schaper A (2012) Akute Kohlenmonoxidvergiftung. Notf Rettungsmed 15:429–435

Anaesthesist 2016 · 65:302
DOI 10.1007/s00101-016-0163-6
Online publiziert: 5. April 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

CrossMark

T. Volk

Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg, Deutschland

Erratum zu: Venenthrombose und Lungenembolie. Aktualisierte S2-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie

Erratum zu:
Anaesthesist (2015)
65(3):212–220
DOI 10.1007/s00101-016-0135-x

In der Online- und Printversion des Beitrags enthält die **Tab. 1** einen Fehler. In den beiden unteren Zeilen sind die Angaben zu wahrscheinlich/unwahrscheinlich vertauscht. Die Tabelle ist hier noch einmal korrekt wiedergegeben.

Wir bitten um Beachtung.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. T. Volk

Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Universitätsklinikum des Saarlandes
Gebäude 57, 66421 Homburg, Deutschland
Thomas.Volk@uniklinikum-saarland.de

Tab. 1 Score zur Ermittlung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Venenthrombose

Kriterien	Punkte
Aktive Tumorerkrankung ^a	1
Parese/Paralyse oder kürzliche Immobilisation der Beine	1
Bettruhe (≥ 3 Tage) oder große Chirurgie (< 4 Monate)	1
Druckschmerzhaftigkeit entlang tiefer Beinvene	1
Schwellung eines ganzen Beins	1
Unterschenkelschwellung > 3 cm zur Gegenseite ^b	1
Ödem am betroffenen Bein	1
Nichtvariköse Kollateralvenen	1
Frühere, dokumentierte TVT	1
Alternative mit gleicher Wahrscheinlichkeit	–2
Summenbildung	
Venenthrombose <i>unwahrscheinlich</i>	0–1
Venenthrombose <i>wahrscheinlich</i>	> 1

TVT Tiefe Venenthrombose

^aPatient erhält eine Therapie in den vergangenen 6 Monaten oder ist in der Palliation

^b10 cm unterhalb der Tuberositas tibiae

Die Onlineversion des Originalbeitrags ist unter doi:10.1007/s00101-016-0135-x zu finden.