Anaesthesist 2017 · 66:373–374
DOI 10.1007/s00101-017-0303-7
Online publiziert: 29. März 2017
© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

CrossMark

U. Jaschinski

Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivtherapie, Klinikum Augsburg, Lehrkrankenhaus LMU München, Augsburg, Deutschland

Erratum zu: Intensivtherapie nach aneurysmatischer Subarachnoidalblutung

Erratum zu:

Anaesthesist 2016 65: 951–970

DOI [10.1007/s00101-016-0242-8](https://doi.org/10.1007/s00101-016-0242-8)

Der Autor macht auf einen Fehler aufmerksam. Auf S. 965 in dem Abschn. „Gestörte Hypophysenfunktion“ steht: In der Akutphase dominiert die Dysfunktion des *Hypophysenvorderlappens*.

Es muss jedoch heißen: *Hypophysenhinterlappen* (HHL).

Korrespondenzadresse

Dr. med. U. Jaschinski

Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivtherapie, Klinikum Augsburg, Lehrkrankenhaus LMU München
Stenglinstrasse 2, 86156 Augsburg, Deutschland
ulrich.jaschinski@klinikum-augsburg.de

Die Online-Version des Originalbeitrages finden Sie unter DOI: [10.1007/s00101-016-0242-8](https://doi.org/10.1007/s00101-016-0242-8).

Hier steht eine Anzeige.