Chirurg 2011 · 82:1124
DOI 10.1007/s00104-011-2215-4
Online publiziert: 24. November 2011
© Springer-Verlag 2011

T. Kölbel · S. Wipper · H. Diener · E.S. Debus
Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin, Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH,
Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg

Erratum zu: Endovaskuläre Therapie der chronisch mesenterialen Ischämie

Chirurg (2011) 82:880–886,
<http://dx.doi.org/10.1007/s00104-011-2101-0>

In diesem Beitrag wurde versehentlich
■ **Abb. 1b** nicht dargestellt.

Wir bitten zukünftig die vollständige
Abbildung zu berücksichtigen und den
Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

PD Dr. T. Kölbel

Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin,
Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH,
Universitätskrankenhaus Eppendorf,
Martinistr. 52, 20152 Hamburg
tilokoelbel@googlemail.com

Abb. 1 ▶ Versorgungsvarianten der arteriellen mesenterialen Strombahn.

a Singulär abgehende A. lienalis (Pfeil). **b** Truncus hepaticomesentericus: die A. hepatica propria entspringt als 1. Ast der A. mesenterica superior (Pfeil). **c** Truncus coeliacomesentericus: gemeinsamer Abgang von Truncus coeliacus und A. mesenterica superior (Pfeil). **d** Gemeinsamer Abgang der A. ileocolica und A. colica dextra als 4. Ast aus dem Truncus coeliacus (Pfeil)