HNO 2013 · 61:37–37
DOI 10.1007/s00106-012-2662-3
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

L. Klimek¹ · U. Goebel² · A. Glowania¹

¹ Zentrum für Rhinologie & Allergologie, Wiesbaden

² Anästhesiologische Universitätsklinik, Albert-Ludwig-Universität, Freiburg

Erratum zu: Management der Anaphylaxie. Teil 2: Therapie und Notfallausrüstung

HNO (2012) 60:1103–1113

<http://dx.doi.org/10.1007/s00106-012-2588-9>

Die Redaktion weist darauf hin, dass im oben genannten CME-Beitrag fehlerhafte Angaben in der ursprünglichen Online-Version gemacht wurden. In der Druckfassung und den online veröffentlichten Versionen wurden die fehlerhaften Angaben nachträglich korrigiert.

Die Dosierungsangaben zur Adrenalingabe auf Seite 1106, 2. Absatz, muss richtig wie folgt lauten:

„Erwachsene und Kinder > 30 kg Körpergewicht erhalten eine Dosis von 300 bis 500 µg, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren erhalten 150 µg i.m.“

Im Fragebogen auf S. 1112 müssen die Antwortmöglichkeiten 1 und 2 zu Frage 5 **„Welche Aussage zum Notfallmedikament Adrenalin trifft nicht zu?“** folgendermaßen lauten:

„Die initiale Adrenalindosis für Erwachsene bei i.m.-Applikation beträgt 300–500 µg.“

sowie

„Die initiale Adrenalindosis für Kinder unter 12 Jahren bei i.m.-Applikation beträgt 150 µg.“

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und die korrekten Angaben zu berücksichtigen.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

Dagmar Lorenz
Redaktion HNO
Springer-Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
dagmar.lorenz@springer.com