Internist 2011 · 52:1476
DOI 10.1007/s00108-011-2976-3
Online publiziert: 16. November 2011
© Springer-Verlag 2011

H.-J. Eppe · M. Zeitz

Medizinische Klinik für
Gastroenterologie, Infektiologie,
Rheumatologie, Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Campus
Benjamin Franklin, Berlin

Erratum zu: Enteritis infectiosa

Internist (2011) 52:1038–1046
<http://dx.doi.org/10.1007/s00108-011-2862-z>

Im genannten Beitrag enthält die Angabe zur Zusammensetzung der oralen Rehydrierungslösung gemäß World Health Organization (WHO) in **Infobox 2** einen Fehler: In der aktuellen WHO-Rezeptur werden anstatt der im Beitrag genannten 2,5 g Natriumbikarbonat 2,9 g Natriumzitat verwendet. Die im Beitrag angegebene Menge entstammt der Originalrezeptur von 1969. Wir bitten um entsprechende Beachtung der hier korrekt abgebildeten Zusammensetzung.

Infobox 2 Orale Rehydrierungslösung^a gemäß World Health Organization

Pro 1 l (abgekochtem) Wasser:

- 13,5 g Glukose
- 2,9 g Natriumzitat
- 2,6 g Natriumchlorid
- 1,5 g Kaliumchlorid

^aFertigmischungen sind kommerziell erhältlich.

Korrespondenzadresse

PD Dr. H.-J. Eppe

Medizinische Klinik für Gastroenterologie,
Infektiologie, Rheumatologie,
Charité – Universitätsmedizin Berlin,
Campus Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin
hans-joerg.eppe@charite.de