Monatsschr Kinderheilkd 2009 · 157:154
DOI 10.1007/s00112-008-1934-1
Online publiziert: 5. Februar 2009
© Springer Medizin Verlag 2009

A. Grüters · H. Krude

Charité Centrum für Frauen-, Kinder-
und Jugendmedizin, Charité-
Universitätsmedizin Berlin, Berlin

Angeborene Hypothyreose

Monatsschr
Kinderheilkd (2008)
156:951–960

Die Autoren machen darauf aufmerksam, dass der genannte Beitrag leider einen Fehler enthält. Im Abschnitt „*Bestätigungsdiagnostik*“ auf S. 956 ist angegeben, dass eine Unterbrechung der Therapie nach 24 Monaten nicht notwendig ist, wenn unter Therapie wiederholt TSH-Erhöhungen $<10 \text{ mU/l}$ auftreten. Die Angabe „ $<10 \text{ mU/l}$ “ ist falsch. Richtig muss es lauten: „ $>10 \text{ mU/l}$ “.

Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. A. Grüters

Charité Centrum für Frauen-,
Kinder- und Jugendmedizin,
Charité-Universitätsmedizin Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
annette.grueters@charite.de

Die Online-Version des Originalbeitrags finden
Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00112-008-1738-3>.