W. Friedl

Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Chirurgische Klinik II, Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, Aschaffenburg, Deutschland

Fraktur oder Strecksehnenaurissverletzung

Anatomie des Streckapparats an der Hand

Leserbrief zum Beitrag

Yarar S, Rueger JM, Schlickewei C (2015) Fingerverletzungen beim Ballsport. Unfallchirurg 118:496–506. doi:10.1007/s00113-014-2723-z

In diesem Artikel besteht meines Erachtens eine falsche Vorstellung von der Anatomie des Streckapparats des Ansatzbereichs am Endglied. Es wird hier postuliert, dass die Busch-Fraktur eine knöcherne Strecksehnenaurissverletzung ist. Im Buch von Tsuge, aber auch anderen Arbeiten, wird zwischen den knöchernen Strecksehnenaurissverletzungen und Busch-Frakturen unterschieden.

Aus anatomischen Studien, z. B. von Schweizer u. Rayan [1] ist zu ersehen, dass die distale Strecksehne an der Endgliedbasis weit nach distal inseriert und bis zu 1,4 mm an die Nagelmatrix herankommt. Daher kann eine Busch-Fraktur, die oft nur wenige Millimeter Längsrichtung aufweist, nicht einer Strecksehnenaurissverletzung entsprechen. Bei einer Strecksehnenaurissverletzung müssten eine Komplettaurissverletzung mit Avulsion des dann langen Knochenfragments oder eine Zerreißung der distal nicht knöchern ausgerissenen Fasern auftreten, um überhaupt eine Dislokation zu induzieren.

Dies zeigt auch die intraoperative Erfahrung, dass fast nie eine komplette Dislokation der Insertionsflächen des Fragments der dorsalen Basisanteile bei der Busch-Fraktur vorhanden ist und immer bindegewebige Fasern nach distal ziehen. Zur Exposition des Frakturbereichs ist es immer notwendig, diese Fasern längs

zu spalten und partiell nach distal abzulösen. Dies ist nicht mit einer distalen Strecksehnenaurissverletzung durch reine Zugkräfte erklärbar.

Daher muss die Busch-Fraktur vielmehr als eine Stauchungsverletzung mit gewaltsamer Hyperflexion angesehen werden, ähnlich wie die ventrale Luxation des Unterschenkels vor das Sprunggelenk bei einer Hyperextension unter Stauchungsbedingungen, der sogenannten Pilon-like-Verletzung.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Dr. W. Friedl

Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Chirurgische Klinik II, Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Am Hasenkopf, 63739 Aschaffenburg Wilhelm.friedl@klinikum-aschaffenburg.de

Literatur

1. Schweitzer TP, Rayan GM (2004) The terminal tendon of the digital extensor mechanism: part 1, anatomic study. J Hand Surg Am 29:898–902