Nervenarzt 2008 · 79:728
 DOI 10.1007/s00115-008-2482-6
 Online publiziert: 16. April 2008
 © Springer Medizin Verlag 2008

B.-M. Mackert^{1,7} · J. Conradi¹ · C. Loddenkemper³ · F.K.H. van Landeghem⁴ ·
 R. Loddenkemper⁶ · R. Ignatius⁵ · T. Schneider²

¹ Klinik für Neurologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin; ² Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin; ³ Institut für Pathologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin; ⁴ Institut für Neuropathologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin; ⁵ Institut für Mikrobiologie und Hygiene, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin; ⁶ Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, Berlin
⁷ Klinik für Neurologie, Auguste-Viktoria-Klinikum, Vivantes, Berlin

Neurotuberkulose

Nervenarzt (2008) 79: 153-166

Im Beitrag „Neurotuberkulose. Eine anhaltende klinische Herausforderung“ von B.-M. Mackert et al. (Nervenarzt 2008 79:153-166) war die Tabelle 5 leider fehlerhaft. Korrekt muss sie lauten:

Korrespondenzadresse

PD Dr. B.-M. Mackert
 Klinik für Neurologie, Auguste-Viktoria-Klinikum, Vivantes
 Rubensstraße 125, 12157 Berlin
 bruno-marcel.mackert@vivantes.de

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00115-007-2322-0> finden.

Tab. 5 Kortikoidtherapie als Begleitmedikation. (Nach Thwaites et al. [70])

MRC-Grad	Grad I	Grad II und III
Medikament	Dexamethason	Dexamethason
1. Woche	0,3 mg/kg/Tag i.v.	0,4 mg/kg/Tag i.v.
2. Woche	0,2 mg/kg/Tag i.v.	0,3 mg/kg/Tag i.v.
3. Woche	0,1 mg/kg/Tag oral	0,2 mg/kg/Tag i.v.
4. Woche	3 mg/Tag oral (insgesamt)	0,1 mg/kg/Tag i.v.
5. Woche	Reduktion um 1 mg/Woche	4 mg/Tag oral (insgesamt)
6. Woche		Reduktion um 1 mg/Woche

MRC Medical Research Council.