Gynäkologe 2016 · 49:896
DOI 10.1007/s00129-016-3963-5
Online publiziert: 23. September 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

Sebastian Häusler · Achim Wöckel · Monika Rehn
Universitätsfrauenklinik Würzburg, Würzburg, Deutschland

Erratum zu: Diagnostik und Management von Adnexraumforderungen

Erratum zu:
Gynäkologe (2016) 49(8):607–622
DOI [10.1007/s00129-016-3918-x](https://doi.org/10.1007/s00129-016-3918-x)

In diesem Beitrag ist die Legende zu **Abb. 1** fehlerhaft. Wir bitten, die **Abb. 1** mit korrekter Legende wie folgt zu beachten.

Der Verlag bittet, den Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

PD Dr. S. Häusler
Universitätsfrauenklinik Würzburg
Josef-Schneider-Str. 4, 97080 Würzburg,
Deutschland
haeusler_s@ukw.de

Abb. 1 ▲ Übersicht der Ursachen für Adnexraumforderungen. Die obere Bildhälfte zeigt die häufigsten prämenopausalen, die untere die häufigsten postmenopausalen Adnextumoren. *Blau* nicht neoplastische Raumforderungen, *hellblau* benigne Neoplasmen, *hellgrau* Neubildungen mit unsicherem Verhalten, *dunkelgrau* die malignen Veränderungen [2, 3, 4]

Die Originalversion dieses Beitrags ist unter
doi:[10.1007/s00129-016-3918-x](https://doi.org/10.1007/s00129-016-3918-x) zu finden.