4. DRK (2017) Gesundheitsversorgung für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in Deutschland. www.drk.de. Zugriffen: 14.9.2017
5. pro familia (2012) Migrations- und kultursensible Beratung in den pro familia Fortbildungen. ExpertInnen-Workshop am 26. Oktober 2012 in Frankfurt am Main. <http://www.profamilia.de/index.php?id=3403>. Zugriffen: 14.9.2017
6. pro familia (2011) Migrationssensible Beratung zu Schwangerschaft, Sexualität, Verhütung und Familienplanung. Workshop am 17. November 2011 in Frankfurt am Main. <http://www.profamilia.de/index.php?id=3403>. Zugriffen: 14.9.2017
7. International Planned Parenthood Federation (IPPF) (1996) Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte. http://www.profamilia.de/fileadmin/profamilia/ippf_charta.pdf. Zugriffen: 14.9.2017
8. pro familia (2015) Regionale Kostenübernahmemodelle von Verhütungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen. Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung bei Schwangerschaftsberatungsstellen vor Ort. <https://www.profamilia.de/interaktiv/publikationen/publikationen.html>. Zugriffen: 14.9.2017

Gynäkologe 2018 · 51:147
<https://doi.org/10.1007/s00129-017-4190-4>
 Online publiziert: 17. Januar 2018

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

CrossMark

Tanja Nadine Stüber · Christine Wulff · Achim Wöckel

Universitäts-Frauenklinik Würzburg, Würzburg, Deutschland

Correction: Diagnostik und Therapie des Vulva- und Vaginalkarzinoms

Correction:

Gynäkologe 2017

<https://doi.org/10.1007/s00129-017-4099-y>

In diesem Beitrag ist die **Tab. 3** fehlerhaft. Wir bitten, die korrekte Form der **Tab. 3** wie folgt zu beachten:

Die Autoren bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Tab. 3 Stadiengerechte operative Therapie von Vulva- und Vaginalkarzinom

	Tumor-stadium	Handlungsempfehlung
Vulva-karzinom	TNM T1	Radikale lokale Exzision; ab pT1b mit inguinalem Staging
	TNM T2	Radikale lokale Exzision oder Vulvektomie, ggf. Radio(chemo)therapie
	TNM T3	Primäre Radiochemotherapie, ggf. neoadjuvante Radio(chemo)therapie Bei Einbruch in Nachbarorgane wird eine Exenteration auch aus palliativer Indikation empfohlen
Vaginal-karzinom	Oberes/mittleres Vaginaldrittel	Abdominale radikale HE und Teilkolpektomie mit Parametrium und Parakolpium + pelvine LNE + inguinofemorale LNE
	Introitusnah	Radikale lokale Resektion bis Kolpovulvektomie mit inguinofemoraler LNE + pelviner LNE
	FIGO II–IV	Primäre Radiatio
	FIGO IV	Ggf. Exenteration oder primäre Radiochemotherapie

FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, HE Hysterektomie, LNE Lymphonodektomie

Korrespondenzadresse

Dr. T. N. Stüber

Universitäts-Frauenklinik Würzburg
 Josef-Schneider-Str. 4, 97080 Würzburg,
 Deutschland
 Stueber_T@ukw.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00129-017-4099-y> zu finden.