Korrespondierender Autor

Dr. M. Bonnin

Clinique Sainte Anne Lumière,
85 Cours Albert Thomas, F-69003 Lyon, Frankreich
E-Mail: mibonnin@hotmail.com

Interessenkonflikt: Keine Angaben

Literatur

1. Aglietti AC (1983) Tibial osteotomy for varus osteoarthritic knee. Clin Orthop 176: 239–251
2. Ahlbäck S (1968) Osteoarthritis of the knee. A radiographic investigation. Acta Radiol 277 (Suppl): 1–72
3. Berman AT, Bosacco SJ, Kirshner S, Avolio A. (1991) Factors influencing long term results in HTO. Clin Orthop 272: 192–198
4. Billings A, Scott DF, Camargo MP, Hofman AA (2000) High tibial osteotomy with a calibrated osteotomy guide, rigid internal fixation and early motion. Long term follow up. J Bone Joint Surg Am 82: 70–79
5. Bouharras M, Hoets F, Watillon M, Despontin J, Gueulette R, Thomas P, Parmentier D (1994) Devenir des OTV pour AFTI avec un recul moyen de 8 ans. Acta Orthop Belg 60: 163–169
6. Cass JR, Bryan RS (1988) High tibial osteotomy. Clin Orthop 230: 196–199
7. Coventry MB, Ilstrup DM, Wallrichs SL (1993) proximal tibial osteotomy. A critical long term study of 87 cases. J Bone Joint Surg Am 75: 196–201
8. Debeyere J, Patte D (1961) the place of corrective osteotomies in the treatment of gonarthrosis. Acta Orthop Belg 27: 374–383
9. Healy WL, Riley LH (1986) High tibial valgus osteotomy. A critical review. Clin Orthop 209: 227–233
10. Hernigou PH, Medevielle D, Debeyre J, Goutailler D (1987) Proximal tibial osteotomy for osteoarthritis with varus deformity. J Bone Joint Surg Am 69: 332–354
11. Holden DL, James SL, Larson RL, Slocum DB (1988) Proximal tibial osteotomy in patients who are 50 years old or less. J Bone Joint Surg Am 70: 977–982
12. Insall J, Joseph DM, Msika C (1984) HTO for varus gonarthrosis. A long term follow up study. J Bone Joint Surg Am 66: 1040–1048
13. Ivarsson I, Mynerts R (1990) HTO for medial osteoarthritis of the knee. J Bone Joint Surg Br 72: 238–244
14. Jackson JP, Waugh W (1961) Tibial osteotomy for osteoarthritis of the knee. J Bone Joint Surg Br 43: 746–751
15. Korovessis P, Katsoudas G, Salonikides P, Stamatakis M, Baikousis A (1999) A medium and long term results of high tibial osteotomy for varus gonarthrosis in an agricultural population. Orthopedics 22: 729–736
16. Levigne C, Bonnin M (1991) Ostéotomie tibiale de valgisation pour AFTI. Journées Lyonnaises de Chirurgie du Genou, Lyon
17. Lootvoet L, Massinon A, Rossillon R, Himmer O, Lambert K (1991) Ostéotomie tibiale haute de valgisation pour gonarthrose sur genu varum. A propos d'une série de 193 cas revus après 6 à 10 ans de recul. Rev Chir Orthop 79: 375–384
18. Majima T, Yasuda K, Katsuragi R, Kaneda K (2000) Progression of joint arthrosis 10 to 15 years after HTO. Clin Orthop 381: 177–184
19. Matthews L, Goldstein SA, Malvitz TA, Katz BP, Kaufer H. (1988) Proximal tibial osteotomy factors that influence the duration of satisfactory function. Clin Orthop 229: 193–200
20. Nagel A, Insall JN, Scuderi GR (1996) Proximal tibial osteotomy: a subjective outcome study. J Bone Joint Surg Am 78: 1353–1358
21. Naudie D, Bourne RB, Rorabeck CH, Bourne TJ (1999) Survivorship of the high tibial valgus osteotomy. Clin Orthop 367: 18–27
22. Odenbring S, Tjörnstrand B, Egund N et al. (1989) Function after Osteotomy for medial gonarthrosis below aged 50 years. Acta Orthop Scand 60: 527–531
23. Odenbring S, Egund N, Knutson K, Lindstrand A, Larsen ST (1990) Revision after osteotomy for gonarthrosis: A 10–19 years follow up of 314 cases. Acta Orthop Scand 61: 128–130
24. Rinonapoli E, Mancini GB, Corvaglia A, Musiello S (1998) Tibial Osteotomy for varus gonarthrosis. Clin Orthop 353: 185–193
25. Rudan JF, Simurda MA (1991) Valgus tibial osteotomy a long term follow up study. Clin Orthop 268: 157–160
26. Stuart MJ, Grace JN, Ilstrup DM, Kelly CM, Adams RA, Morrey BF (1990) Late recurrence of varus deformity after proximal tibial osteotomy. Clin Orthop 260: 61–65
27. Yashuda K, Majima T, Tsuchida T, Kaneda K (1992) A 10 to 15 years follow up observation of HTO in medial compartment OA. Clin Orthop 282: 186–195

Erratum

Orthopäde 2004 · 33:141
DOI 10.1007/s00132-004-0634-3
Online publiziert: 23. Januar 2004
© Springer-Verlag 2004

G. Petje · C. Radler · N. Aigner

G. Kriegs-Au · R. Ganger · F. Grill

Abteilung für Kinderorthopädie,
Orthopädisches Spital Wien-Speising

Aseptische Knochennekrosen im Kindesalter. Diagnose und Therapie

Orthopäde (2002) 31:1027–1038

G. Petje, der Autor des Beitrags „Aseptische Knochennekrosen im Kindesalter“, machte uns darauf aufmerksam, dass die auf Seite 1033 angegebene Dosierung für Ilomedin® falsch ist. Die richtige Dosierung beträgt 2 ng/kg/min. Der Autor bittet diesen Fehler zu entschuldigen.

Korrespondierender Autor

Dr. G. Petje

Abteilung für Kinderorthopädie,
Orthopädisches Spital Wien-Speising,
Speisingerstraße 109, 1130 Wien
E-Mail: gert.petje@oss.at