ses Kniestreck- wie auch ein Hüftstreckdefizit toleriert werden, die Hüften sollten aber zentriert sein!

Korrespondenzadresse

Dr. S. Senst

CA Abteilung für Kinderorthopädie,
Schön Klinik Hamburg Eilbek,
Dehnhaike 120, 22081 Hamburg
st.senst@gmail.com

Einhaltung der ethischen Richtlinien

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor S. Senst gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren.

Literatur

1. Brunner R (2010) Gangverbessernde Maßnahmen bei Patienten mit Zerebralpareesen. *Orthopäde* 39: 15–22
2. Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P (2005) Proposed definition and classification of cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol* 47:571–576
3. Gages JR, Schwartz MH, Koop SE, Novacheck TF (2009) The identification and treatment of gait problems in cerebral palsy. *Clinics in developmental medicine* no 181–181, 2. Aufl. Mac Keith Press, London
4. Keenan MAE (1993) *Manual of orthopaedic surgery for spasticity*. Raven Press, New York
5. Rosenbaum PL, Palisano RJ, Bartlett DJ et al (2008) Development of the gross motor function classification system for cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol* 50:249–253
6. Senst S (2010) Neurogene Fußdeformitäten. *Orthopäde* 39:31–38
7. Stout JL, Gage JR, Schwartz MH, Novacheck TF (2008) Distal femoral extension osteotomy and patellar tendon advancement to treat persistent crouch gait in cerebral palsy. *J Bone Joint Surg [Am]* 90(11):2470–2484
8. Thom H (Hrsg) (1982) *Die infantilen Zerebralpareesen*, 2. Aufl. Thieme, Stuttgart New York

Erratum

Orthopäde 2013 · 42:1046–1047 DOI 10.1007/s00132-013-2195-9

Online publiziert: 2. Dezember 2013 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

V. Krenn¹ · C. Poremba¹ · J. Schneider² · D. Kendoff³ · T. Gehrke³ · J.P. Kretzer⁴ · M. Thomsen^{5,6} · M. Huber⁷

¹ Zentrum für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik, Trier

² Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München

³ HELIOS Endo-Klinik, Hamburg

⁴ Labor für Biomechanik und Implantatforschung, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg

⁵ Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, DRK-Klinik Baden-Baden

⁶ Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Stadtklinik Baden-Baden

⁷ Pathologisch-bakteriologisches Institut, Otto-Wagner-Spital, Wien

Erratum zu: Histopathologische Differenzialdiagnostik bei gelenkimplantallergischen Fragestellungen

In diesem Beitrag kam es leider zu einem Fehler in **Abb. 2**.

Bitte beachten Sie die auf der folgenden Seite abgedruckte korrekte Version der Abbildung. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. V. Krenn

Zentrum für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik
Max-Planck-Str. 5, 54296 Trier
krenn@patho-trier.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. V. Krenn, C. Poremba, J. Schneider, D. Kendoff, T. Gehrke, J.P. Kretzer, M. Thomsen, M. Huber geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren.

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00132-012-2034-4> finden.

Abb. 2 ▲ Histopathologischer Partikelalgorithmus (Version 2 nach Krenn). *BBR* Berlinerblaureaktion, *POL* polarisationsoptische Analyse