31. Saccomanno MF, DE Ieso C, Milano G (2014) Acromioclavicular joint instability: anatomy, biomechanics and evaluation. *Joints* 2:87–92
32. Saier T, Venjakob AJ, Minzlaff P et al (2015) Value of additional acromioclavicular cerclage for horizontal stability in complete acromioclavicular separation: a biomechanical study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 23:1498–1505
33. Schaefer FK, Schaefer PJ, Brossmann J et al (2006) Experimental and clinical evaluation of acromioclavicular joint structures with new scan orientations in MRI. *Eur Radiol* 16:1488–1493
34. Scheibel M, Droschel S, Gerhardt C et al (2011) Arthroscopically assisted stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations. *Am J Sports Med* 39:1507–1516
35. Scheibel M, Ifesanya A, Pauly S et al (2008) Arthroscopically assisted coracoclavicular ligament reconstruction for chronic acromioclavicular joint instability. *Arch Orthop Trauma Surg* 128:1327–1333
36. Schlegel TF, Burks RT, Marcus RL et al (2001) A prospective evaluation of untreated acute grade III acromioclavicular separations. *Am J Sports Med* 29:699–703
37. Song T, Yan X, Ye T (2016) Comparison of the outcome of early and delayed surgical treatment of complete acromioclavicular joint dislocation. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 24:1943–1950
38. Tauber M (2013) Management of acute acromioclavicular joint dislocations: current concepts. *Arch Orthop Trauma Surg* 133:985–995
39. Tauber M, Gordon K, Koller H et al (2009) Semitendinosus tendon graft versus a modified Weaver-Dunn procedure for acromioclavicular joint reconstruction in chronic cases: a prospective comparative study. *Am J Sports Med* 37:181–190
40. Tauber M, Koller H, Hitzl W et al (2010) Dynamic radiologic evaluation of horizontal instability in acute acromioclavicular joint dislocations. *Am J Sports Med* 38:1188–1195
41. Tischer T, Salzmann GM, El-Azab H et al (2009) Incidence of associated injuries with acute acromioclavicular joint dislocations types III through V. *Am J Sports Med* 37:136–139
42. Venjakob AJ, Salzmann GM, Gabel F et al (2013) Arthroscopically assisted 2-bundle anatomic reduction of acute acromioclavicular joint separations: 58-month findings. *Am J Sports Med* 41:615–621
43. Zumstein MA, Schiessl P, Ambuehl B et al (2017) New quantitative radiographic parameters for vertical and horizontal instability in acromioclavicular joint dislocations. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. <https://doi.org/10.1007/s00167-017-4579-6>

Orthopäde 2018 · 47:167

<https://doi.org/10.1007/s00132-017-3521-4>

Online publiziert: 5. Januar 2018

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

CrossMark

C. Chiari · S. Walzer · D. Stelzeneder · M. Schreiner · R. Windhager

Universitätsklinik für Orthopädie, Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich

Correction: Therapeutische Anwendung von Stammzellen in der Orthopädie

Correction:

Orthopäde 2017

<https://doi.org/10.1007/s00132-017-3475-6>

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrte Leser,
leider wurde im oben genannten Beitrag im Abbildungsverweis auf die Abb. 3 und Abb. 4 auf einen falschen Fall hingewiesen. Korrekt muss es lauten: In Abb. 3 ist ein Fallbeispiel einer 15-jährigen Patientin dargestellt, die bei einem Grad-IV-Knorpeldefekt des lateralen Femurcondylus mit der beschriebenen Methode erfolgreich behandelt wurde. Abb. 4 zeigt ein Fallbeispiel einer 24-jährigen Patientin, die wegen eines osteochondralen Talusdefektes operiert wurde.

Wir bitten um Berücksichtigung der Korrektur und entschuldigen uns für den Fehler.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

Ao. Univ. Prof. Dr. C. Chiari, MSc

Universitätsklinik für Orthopädie, Medizinische Universität Wien

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien, Österreich
catharina.chiari@meduniwien.ac.at

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00132-017-3475-6> zu finden.