nen, regressive Bewegungen einzugrenzen und altersgerechte, gesunde Widerstände von symptomspezifischen Vermeidungstendenzen differenzieren zu können. Neben der Betonung des Beziehungsaspekts in der Behandlungstechnik sind die für die Symptomatik typische hohe Anspruchshaltung an sich selbst sowie die damit zusammenhängende ausgeprägte Bedeutung von Schamerleben zu bearbeiten, um die kontrollierte Progression der selbstständigen Erfahrungen des Patienten außerhalb der Stunden zu ermöglichen und zu unterstützen.

Korrespondenzadresse

Dipl.-Psych. Kerstin Scholtes
Institut für Psychosomatische
Kooperationsforschung und Familientherapie
Bergheimer Str. 54, 69115 Heidelberg
Kerstin.scholtes@med.uni-heidelberg.de

Interessenkonflikt. Die korrespondierende Autorin gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

- Beesdo K, Bittner A, Pine DS et al (2007) Incidence of social anxiety disorder and the consistent risk for secondary depression in the first three decades of life. *Arch Gen Psychiatry* 64:903–912
- Bowlby J (1988) A secure base: clinical applications of attachment theory. Routledge, London
- Breyer A (2012) In der Rückzugsspirale. *Zeit* 25:70
- Crits-Christoph P, Crits-Christoph K, Wolf-Palacio D et al (1995) Brief supportive-expressive psychodynamic therapy for generalized anxiety disorder. In: Barber JP, Crits-Christoph P (Hrsg) *Dynamic therapies for psychiatric disorders (axis I)*. Basic Books, New York, S 43–83
- Cutler JL, Goldyne A, Markowitz JC et al (2004) Comparing cognitive behavior therapy, interpersonal psychotherapy, and psychodynamic psychotherapy. *Am J Psychiatry* 161:1567–1573
- Faravelli C, Zucchi T, Viviani B et al (2000) Epidemiology of social phobia: a clinical approach. *Eur Psychiatry* 15:17–24
- Gabbard GO (1992) Psychodynamic of panic disorders and social phobia. *Bull Menninger Clin* 56(Suppl A):3–13
- Hoffmann SO (2003) Soziale Ängste: die psychodynamische Perspektive in Konzeptbildung und Behandlungsansätzen. *Psychother Dialog* 4:32–41
- Horn H, Reich G, Winkelmann K, Leichsenring F (2010) *Psychoanalytisch-orientierte Fokalthherapie der sozialen Phobie bei Jugendlichen: ein Behandlungsmニュアル auf Grundlage der supportiv-expressiven Therapie Luborskys (unveröffentlichtes Manuskript)*
- Janssen PL, Joraschky P, Tress W (Hrsg) (2009) *Leitfaden psychosomatische Medizin und Psychotherapie*. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln
- Keller MB (2003) The lifelong course of social anxiety disorder: a clinical perspective. *Acta Psychiatr Scand* 108(Suppl):85–95

- Kessler RC (2003) The impairments caused by social phobia in the general population: implications for intervention. *Acta Psychiatr Scand Suppl* 108:19–27
- Leichsenring F, Beutel ME, Leibig E (2008) Psychoanalytisch-orientierte Fokalthherapie der sozialen Phobie. *Psychotherapeut* 53:185–197
- Luborsky L (1995) Einführung in die analytische Psychotherapie. Ein Lehrbuch. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
- Luborsky L (2001) The only clinical and quantitative study since Freud of the preconditions for recurrent symptoms during psychotherapy and psychoanalysis. *Int J Psychoanal* 82:1133–1154
- Stangier U, Clark DM, Ehlers A (2006) Soziale Phobie. Hogrefe, Göttingen
- Streek U (2007) Psychotherapie komplexer Persönlichkeitsstörungen. Klett-Cotta, Stuttgart
- Wittchen H-U, Fehm L (2003) Epidemiology and natural course of social fears and social phobia. *Acta Psychiatr Scand* 108(Suppl):4–18

Psychotherapeut 2013 · 58:175
DOI 10.1007/s00278-013-0974-8
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

**Sefik Tagay · Nevena Repic ·
Wolfgang Senf**

Klinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, LVR-Klinikum/
Universitätsklinik Duisburg-Essen, Essen

Erratum zu: Traumafolgestörungen bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen Diagnostik mithilfe von Traumafragebogen

Psychotherapeut (2013)
<http://dx.doi.org/10.1007/s00278-011-0847-y>

Durch einen technischen Fehler wurde fälschlicherweise der Umfang des Beitrags im Quellenvermerk nicht korrekt angegeben, S. 44–45 statt S. 44–55. Der Verlag bittet, diesen Fehler zu entschuldigen.

In korrekter Form ist die Arbeit in Springer Link (www.psychotherapeut.springer.de) unter der o.g. doi-Adresse abrufbar.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

Dr. Dipl.-Psych. Sefik Tagay
Klinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie, LVR-Klinikum/Universitätsklinik
Duisburg-Essen
Virchowstr. 174, 45147 Essen
Sefik.tagay@uni-due.de