Ophthalmologe 2016 · 113:878
DOI 10.1007/s00347-016-0354-1
Online publiziert: 15. September 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

CrossMark

M. Bauer¹ · S. Koinzer¹ · I. Oschlies² · A. Claviez³ · K. Tiede⁴ · J. Roider¹ · B. Nölle¹

¹ Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland

² Institut für Pathologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland

³ Klinik für Allgemeine Pädiatrie, UKSH Campus Kiel, Kiel, Deutschland

⁴ UKSH, Campus Kiel, Apotheke des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Kiel, Deutschland

Einseitige Oberlidmembran bei Conjunctivitis lignosa

Erwiderung

Zum Leserbrief von Schmidt D (2016) Theodor Lebers Erstbeschreibung einer Conjunctivitis petrificans (1895, 1900). Ophthalmologe, doi:[10.1007/s00347-015-0097-4](https://doi.org/10.1007/s00347-015-0097-4)
Originalbeitrag: Bauer M, Koinzer S, Oschlies I et al. (2016) Conjunctivitis lignosa. Ophthalmologe 113:416–419. doi:[10.1007/s00347-015-0097-4](https://doi.org/10.1007/s00347-015-0097-4)

Wir begrüßen die medizinhistorischen Ausführungen des Leserbriefes. Bei der vorgestellten Kasuistik erschienen die einseitigen Membranen hartnäckig und über Jahre rezidivierend, mit derber jedoch nicht steinharter oder hölzerner Konsistenz.

Es gab keinen Anhalt für eine hereditäre Erkrankung in der betroffenen Familie. Auch liegt keine Verwandtschaft der Eltern vor.

Korrespondenzadresse

Dr. M. Bauer

Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel
Arnold-Heller-Str. 3, 24105 Kiel, Deutschland
maya.bauer@uksh.de

Interessenkonflikt. M. Bauer, S. Koinzer, I. Oschlies, A. Claviez, K. Tiede, J. Roider und B. Nölle geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.