Ophthalmologe 2017 · 114:77–78
DOI 10.1007/s00347-016-0429-z
Online publiziert: 10. Januar 2017
© Springer Medizin Verlag Berlin 2016

V. Prokosch · D. C. Dragnea · S. Pitz

Augenklinik der Universitätsmedizin, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Mainz, Deutschland

Erratum zu: Differenzialdiagnose der Papillenschwellung. Wichtige Differenzialdiagnosen im Überblick

Erratum zu:

Ophthalmologe (2016) 113:967–981

DOI 10.1007/s00347-016-0353-2

In diesem Beitrag der Rubrik „CME Zertifizierte Fortbildung“ wurde eine Frage nicht korrekt wiedergegeben. Wir bitten, die korrekte Version des CME-Fragebogens in dem Online-Kurs zu berücksichtigen.

? Bei Verdacht einer intraorbitalen Raumforderung mit Papillenschwellung ist welches bildgebende Verfahren das Verfahren der Wahl:

- ☐ Bulbussonographie
- ☐ Computertomographie
- ☐ Farbkodierte Duplexsonographie der Orbita
- ☐ Magnetresonanztomographie (MRT)
- ☐ Optische Kohärenztomographie (OCT)

Korrespondenzadresse

PD Dr. V. Prokosch

Augenklinik der Universitätsmedizin, Johannes
Gutenberg Universität Mainz
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Deutschland
verena.prokosch-willing@unimedizin-
mainz.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<http://dx.doi.org/10.1007/s00347-016-0353-2>
zu finden.

Hier steht eine Anzeige.