Diabetes

Von einer seltenen Erkrankung zum Volksleiden

Diabetes mellitus gehört heutzutage zu den großen Volkskrankheiten. Historisch gesehen wurden die Symptome von Diabetes mellitus erstmalig vom griechischen Arzt Galen (129–200 n. Chr.) als sehr seltene Erkrankung beschrieben. Diese wurde als Problem der Niere dargestellt, was bis ins 19. Jahrhundert Bestand hatte. Der Name Diabetes leitet sich vom griechischen Wort „diabainein“ (eine Art Siphon bzw. Heber, durch den Flüssigkeit fließt) ab und steht für den starken Harndrang der Diabetiker. Mellitus kommt vom griechischen Wort „meliotos“ und bedeutet honigsüß. Den so gemeinten süßen Geschmack von Urin des Diabetikers beschrieb Avicenna (980–1037). Paul Langerhans entdeckte im 19. Jahrhundert die nach ihm benannten Inseln der Bauchspeicheldrüse, die erst später als Insulin produzierende Zellen erkannt wurden. Die nachfolgende Entdeckung, dass deren experimentelle Entfernung Diabetes bewirkte, war die Grundlage der Suche von Frederick Banting nach der Wirksubstanz. 1921 konnte Banting Insulin isolieren und so die Basis aller Therapien des Diabetes schaffen.

Die Prävalenz von Diabetes mellitus ist in den letzten 50 Jahren stark gestiegen. Dies wird vor allem auf drei Faktoren zurückgeführt: der starke Anstieg von Adipositas, die Reduktion der körperlichen Aktivität und die starke Zunahme der Lebenserwartung. Insbesondere im Alter nimmt die Prävalenz des Diabetes mellitus in der Bevölkerung stark zu. Ergebnisse einer Umfrage 2009 zeigen zusätzlich eine Steigerung der Diabeteshäufigkeit mit abnehmendem Bildungsstatus. Dies

ist am deutlichsten bei den über 50-jährigen Frauen ausgeprägt [1].

Was verursacht nun diese Erkrankung? Vereinfacht lässt sich sagen, dass hierbei die Aufnahme von Glukose in Zellen, wie die Muskelzellen, gestört ist. Da Glukose für das Gehirn überlebenswichtig ist, versucht der Körper, eine konstante Konzentration im Blut zu erreichen. Kommt über die Nahrung zu viel Zucker im Blut an, stimuliert Insulin dessen Aufnahme in Gewebe. Erhält der Körper zu wenig Zucker, setzt der Gegenspieler von Insulin, Glukagon, diesen aus dem Gewebe wieder frei. Diese Balance ist bei Diabetikern gestört und führt zu ungewöhnlich hohen Zuckerspiegeln im Blut. Das heißt, der Zucker wird nicht oder nur verlangsamt vom Gewebe aufgenommen und ist dann auch im Urin vermehrt zu finden (honigsüßer Harn).

Prinzipiell können zwei große Typen von Diabetes unterschieden werden. Der insulinabhängige Typ-1-Diabetes ist häufig die vorherrschende Form bei Menschen in jungen Jahren und steht nicht in Zusammenhang mit Übergewicht und fehlender körperlicher Aktivität. Bei dieser Diabetesform hat das körpereigene Immunsystem in einer Fehlreaktion die eigenen β -Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Die Patienten können nun kein eigenes Insulin mehr produzieren und demzufolge auf eine Zuckeraufnahme mit der Ernährung nicht mehr reagieren. Sie sind immer auf zusätzliche Insulingaben angewiesen. Demgegenüber reagieren die Körperzellen beim Typ-2-Diabetes zu wenig auf Insulin. Die Insulinrezeptoren werden mit der Zeit immer unsensibler,

sodass auch hier die Blutzuckerregulation nicht mehr funktioniert. Dem Entstehen eines Diabetes mellitus Typ 2 geht in den meisten Fällen ein Leben mit Übergewicht und wenig Bewegung voraus.

Im vorliegenden Themenheft wird versucht, einen Bogen von den Grundlagenwissenschaften hin zur ärztlichen Versorgung und dem Gesundheitsmanagement von Patienten zu schlagen.

Eckers et al. stellen in ihrem Beitrag den oxidativen Stress und das Endothel in den Mittelpunkt. Naturgemäß nehmen die Endothelzellen als erste Zellen einen erhöhten Zuckerspiegel im Blut wahr. Ein manifestierter Diabetes führt zum Anstieg des oxidativen Stresses und trägt so zur Schädigung des Endothels bei. Parallel dazu sinken die zelleigenen Abwehrsysteme gegen oxidativen Stress. Die daraus resultierenden Folgen auch auf die von Telomeren abhängige Zellalterung werden aufgezeigt.

Lifestyleprodukte zielen oft in Richtung Reduktion des oxidativen Stresses. Dazu gehören industriell gefertigte Vitamine (ACE-Produkte), aber auch beworbene Genussmittel wie Rotwein oder grüner Tee. Eine zweite direkte Folge erhöhter Zuckerwerte ist die Glykierung (Verzuckerung) von Proteinen. Dieser Mechanismus wird von *Simm et al.* beschrieben. Die Proteinglykierung hat mehrere Folgen: Sie führt einerseits zur Produktion von Radikalen, mit den Folgen, die bei *Eckers et al.* beschrieben werden. Proteine können andererseits ihre Funktion verlieren – im Falle von Wachstumsfaktoren resultiert dies möglicherweise in einem Wundheilungsproblem bei Dia-

betes. Ferner können glykierte Proteine quervernetzen, was eine Gewebeversteifung und das Herz betreffend eine diastolische Dysfunktion zur Folge hat, oder nach Bindung an bestimmte Rezeptoren auch eine inflammatorische Antwort hervorrufen. So modifizierte Proteine werden aber ebenso über erhitzte Nahrung aufgenommen. Interessanterweise findet eine solche Reaktion, die im Körper als Alterungsmechanismus bekannt ist, auch bei den sog. Selbstbräunern statt. Diesbezüglich ist aber noch zu wenig über Langzeitfolgen bekannt.

Die Behandlung von Diabetes bei alten Patienten ist Thema der Arbeit von Meyer. Die Autorin weist zu Recht auf Probleme bei der Umsetzung von leitliniengerechten Therapien hin, wenn alte, multimorbide Patienten mit Gelenkproblemen nicht mehr in der Lage sind, Sport zu treiben. Hier steht die Verbesserung der Lebensqualität und der Alltagskompetenzen im Vordergrund. Diese lässt sich je nach Patiententyp – von den fitten Älteren (Go-goes) bis zu den Pflegebedürftigen (No-goes) – ganz unterschiedlich erreichen. Eine sehr große Gefahr bei alten Patienten ist die Situation der Unterzuckerung (Hypoglykämie). Sie ist eine wichtige Ursache für die im Alter gefürchteten Stürze und hat auch Einfluss auf die Demenzentwicklung. Meyer stellt die verschiedenen Behandlungsoptionen vor und weist auf die praktische Durchführbarkeit bei alten Patienten hin.

Der Beitrag von Pfeifer et al. fokussiert insbesondere auf die Bewegungstherapie. Wie bereits erwähnt wird der Diabetes mellitus Typ 2 auch als Bewegungsmangelerkrankung gesehen. Dies lässt sich auch insoweit leicht nachvollziehen, als die Skelettmuskulatur das wichtigste Zucker verbrauchende Organ ist. Mit weniger Bewegung (z. B. im Alter) geht die Muskulatur zurück und die Gefahr des hohen Zuckergehalts im Blut erhöht sich. Die Autoren weisen darauf hin, dass heutzutage Patienten mit Typ-2-Diabetes zu häufig medikamentös und zu wenig mit speziellen Bewegungsprogrammen therapiert werden. Die Behandlung sollte sich zukünftig nicht an der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD), sondern an der Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-

sundheit (ICF) orientieren. Im Rahmen der ICF wird von funktionaler Gesundheit und Ressourcenorientierung gesprochen. In dieses Gedankengebäude werden die Bewegungsprogramme von der Konzeptualisierung bis zur Evaluation eingebracht.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich Diabetes mellitus von einer seltenen zu einer Volkskrankheit hin verändert hat. Insbesondere in der älteren Bevölkerung ist der Typ-2-Diabetes weit verbreitet und verursacht hohe Kosten. Das Verständnis der molekularen Grundlagen könnte in der Zukunft zu neuen Behandlungsoptionen führen. Die aktuellen Therapien sollten einerseits an die Bedürfnisse und Realitäten der älteren Bevölkerung angepasst und andererseits grundlegend auf die Verbesserung der individuellen Ressourcen ausgerichtet werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass das vorliegende Heft zum Verständnis des Diabetes mellitus beiträgt.

Andreas Simm

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. A. Simm
Klinik und Poliklinik
für Herz- und Thoraxchirurgie
Universitätsklinikum
Halle (Saale)
Ernst-Grube-Str. 40
06120 Halle
andreas.simm@
medizin.uni-halle.de

Literatur

1. Robert-Koch-Institut (2011) Diabetes mellitus in Deutschland. GBE kompakt 3:2