R. Püllen

Agaplesion Frankfurter Diakonie-Kliniken, Frankfurt a. M., Deutschland

Journal Club

Originalpublikation

Hamada S, Gulliford MC (2016) Drug prescribing during the last year of life in very old people with diabetes. *Age Ageing* 46:147–151

Multimedikation bei hochbetagten Diabetikern im letzten Lebensjahr

Hintergrund. Je älter ein multimorbider Patient wird, desto geringer ist die Bedeutung einer rein präventiven medikamentösen Therapie. Die vorliegende Studie sollte die Frage beantworten, welche und wie viele Medikamente ältere Diabetiker im letzten Jahr ihres Lebens erhalten.

Methode. In die bevölkerungsbezogene retrospektive Kohortenstudie aus Großbritannien wurden 5324 Diabetiker aufgenommen. Das mediane Alter betrug 86 Jahre; die Hälfte von ihnen war weiblich. Ausgewertet wurden Patientenakten von Patienten, die zwischen 2011 und 2013 verstarben und die mindestens einmal im Quartal von ihrem Hausarzt gesehen wurden.

Ergebnisse. Die Gesamtzahl aller verschriebenen Medikamente war mit 6,2 (Standardabweichung $\pm 3,1$) während des ganzen letzten Lebensjahres stabil. Es erhielten 78 % der Patienten Antidiabetika, überwiegend Metformin und Sulfonylharnstoffe. Mit Antihypertensiva wurden 76 % der Patienten behandelt, 62 % erhielten Statine und 46 % Acetylsalicylsäure in niedriger Dosis. Im Vergleich zum ersten Quartal der einjährigen Beobachtungszeit sank in den letzten 3 Monaten vor dem Tod die Verschreibungsrate dieser Medikamente nur um 3–8 %. Dafür wurden in den 3 Monaten vor dem

Tod deutlich mehr Antibiotika, ZNS-Medikamente, Atemwegsmedikamente und systemische Hormone verschrieben.

Kommentar

Selbst im letzten Jahr vor ihrem Tod erhielten hochbetagte Diabetiker eine Multimedikation, die zu einem großen Teil präventiv wirkende kardiovaskuläre Medikamente umfasste. Beim Verschreiben von Medikamenten, die keine Beschwerden lindern, sondern unerwünschte Ereignisse verhindern sollen, ist eine Abschätzung der vermuteten Lebenserwartung unerlässlich, da in Zulassungsstudien – bei jüngeren Patienten – oft eine mehrjährige Behandlung erforderlich war, um ein unerwünschtes Ereignis zu verhindern. Gerade bei hochbetagten multimorbiden Diabetikern ist es zentrale Aufgabe des behandelnden Arztes, immer wieder den erwarteten Nutzen eines Präparats den stets häufiger werdenden unerwünschten Wirkungen gegenüberzustellen und ggf. eine Therapie zu beenden. Die Bereitschaft zum „deprescribing“, also zum systematischen Absetzen einer Dauermedikation, wird bei Ärzten steigen, wenn die Evidenz für dieses Vorgehen durch weitere Studien größer wird.

Schützen Antidepressiva vor einer Demenz?

Originalpublikation

Brodrick JE, Mathys ML (2016) Antidepressant exposure and risk of dementia in older adults with major depressive disorder. *J Am Geriatr Soc* 64 2517–2521

Bei älteren Patienten mit einer Depression korreliert die Dauer einer medikamentösen antidepressiven Behandlung

mit der Wahrscheinlichkeit, im weiteren Verlauf an einer Demenz zu erkranken. Von den depressiven Patienten, die demenz wurden, erhielten lediglich 22 % eine antidepressive Therapie von mindestens 5 Jahren Dauer, während es bei den Patienten, die kognitiv fit blieben, 54 % waren ($p = 0,04$).

Zu diesem Ergebnis kommt eine retrospektive Beobachtungsstudie mit 477 Patienten; ihr mittleres Alter lag bei 81 Jahren. Von diesen 447 Patienten erkrankten 41 im weiteren Verlauf an einer Demenz, 37 dieser Patienten wurde eine gleich große Zahl depressiver Patienten gegenübergestellt, die kognitiv intakt blieben. Beide Patientengruppen stimmten bei Studienbeginn in wesentlichen Charakteristika wie Alter und Begleitkrankheiten überein. Die Art des verwendeten Antidepressivums spielte keine erkennbare Rolle; am häufigsten – in mehr als 80 % der Fälle – wurden selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) gegeben.

Trotz methodischer Einschränkungen – v. a. infolge der geringen Patientenzahl – weist diese Studie auf den Nutzen einer mindestens 5-jährigen antidepressiven medikamentösen Therapie im Hinblick auf Demenzvermeidung hin. Ob Antidepressiva wirklich vor einer Demenz schützen, können nur größere randomisierte, prospektive Studien klären.

Korrespondenzadresse

PD Dr. R. Püllen

Agaplesion Frankfurter Diakonie-Kliniken
 Holzhausenstr. 72–92, 60322 Frankfurt a. M.,
 Deutschland
 Rupert.puellen@fdk.info

Interessenkonflikt. R. Püllen gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.