Schmerz 2014 · 28:183–183
 DOI 10.1007/s00482-014-1419-1
 Online publiziert: 9. April 2014
 © Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
 Published by Springer-Verlag Berlin Heidelberg
 - all rights reserved 2014

B. Messerer¹ · G. Grögl² · W. Stromer³ · W. Jaksch⁴

¹ Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Medizinische
 Universität Graz, LKH-Universitätsklinikum Graz, Graz

² Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Rudolfstiftung Wien, Wien

³ Abteilung für Anästhesiologie und allgemeine Intensivmedizin, Landeskrankenhaus Waldviertel Horn, Horn

⁴ Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin, Wilhelminenspital der Stadt Wien, Wien

Erratum zu: Perioperative systemische Schmerztherapie bei Kindern. Österreichische interdisziplinäre Handlungsempfehlungen zum perioperativen Schmerz- management bei Kindern

Die Redaktion macht darauf aufmerksam, dass Tab. 4 fehlerhaft abgedruckt wurde. In der folgenden, korrigierten, Tabelle (■ **Tab. 1**) sind die Änderungen hervorgehoben. Wir bitten, die Änderungen der Dosierungsempfehlungen zu beachten und den Fehler zu entschuldigen.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

Dr. B. Messerer

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Medizinische Universität Graz, LKH-Universitätsklinikum Graz
 Auenbruggerplatz 29, 8036 Graz
 Österreich
 brigitte.messerer@medunigraz.at

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00482-013-1384-0> finden.

Tab. 1 Tab. 4: Dosierungshinweise für Opiode in Aufwachraum und Intensivstation

Medikament	Applikation	Dosis	Anmerkung
Tramadol	Oral Rektal Kurzinfusion	0,5–1–(2) mg/kgKG	Maximale Tagesdosis: 6 mg/kgKG bzw. 400 mg
	Kontinuierlich	0,25 mg/kgKG/h	
Nalbuphin	Kurzinfusion	FG: 0,025 mg/kgKG; NG bis Ende des 3. LM: 0,025–0,05 mg/kgKG; ab 4. LM: 0,05–0,1 mg/kgKG	Gute klinische Erfahrung bei geringer Datenlage Ceiling-Effekt bei >0,2 mg/kgKG
Morphin	Titrierend i.v.	Bis Ende des 6. LM: 20–30–(50) µg/kgKG; ab 7. LM: 30–50–(100) µg/kgKG	Unter intensivmedizinischer Überwachung keine Maximaldosis
	Kontinuierlich (Startdosis)	Bis Ende des 6. LM: 5–10 µg/kgKG/h; ab 7. LM: 10–20 µg/kgKG/h	
Piritramid	Titrierend i.v.	Bis Ende des 6. LM: 0,025–0,05 mg/kgKG; ab 7. LM: 0,05–0,1 mg/kgKG	Unter intensivmedizinischer Überwachung keine Maximaldosis

FG Frühgeborene; LM Lebensmonat; NG Neugeborene.