Schmerz 2015 · 29:530
 DOI 10.1007/s00482-015-0064-7
 Online publiziert: 21. September 2015
 © Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. Published
 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg - all rights
 reserved 2015

M. Schuler¹ · N. Griebinger²

¹ Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin, Diakonissenkrankenhaus Mannheim, Mannheim, Deutschland

² Schmerzzambulanz, Anästhesiologische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Deutschland

Erratum zu: Opioide bei Nichttumorschmerz im höheren Lebensalter

Erratum zu:

Schmerz (2015) 29:380–401

DOI 10.1007/s00482-015-0029-x

In der *Online-first-Version* dieses Beitrags enthält **Tab. 3** einen Fehler bei einer Dosierungsangabe bezüglich der Einheiten Milligramm und Mikrogramm. Diese Fassung ist online nicht mehr verfügbar. In der Druckfassung in Ausgabe 4, Band 29, 2015, S. 390, und in der aktuellen Online-Fassung ist der Fehler korrigiert.

Die falsche Angabe steht in der *Online-first-Fassung* in **Tab. 3**, S. 11 des PDFs, 3. Seite der Tabelle, bei der Literaturstelle [58]: Die Angabe *mg* ist falsch, richtig ist *µg*.

Ein Ausschnitt mit den richtigen Angaben ist in der hier abgedruckten Tabelle dargestellt.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

PD Dr. M. Schuler

Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin
 Diakonissenkrankenhaus Mannheim
 Speyerer Str. 91–93
 68163 Mannheim
 matthias.schuler@diakonissen.de

Die Online-Version des Originalbeitrags ist unter doi: [10.1007/s00482-015-0029-x](https://doi.org/10.1007/s00482-015-0029-x) zu finden.

Tab. 3 Übersicht über mittleres Alter, Indikation der Analgetikatherapie, Dauer (Titration + Therapie), verwendetes Opioid mit mittlerer, erreichter Tagesdosis; unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Abbruchraten in den randomisierten Studien, die verschiedene Opioide zur Wirksamkeit bei nichtmalignen Schmerzen verglichen (Studienauswahl nach [61])

Literatur	Mittleres Alter (Jahre)/Anteil > 65 Jahre (%)	Indikation	Dauer (Wochen)	Opioid Tagesdosis Patientenzahl (n)
[58]	64,4–64,2/65,2–52,3	Arthrose Hüfte	12	Buprenorphin 5–20 µg 69