Priv.-Doz. Dr. Matthias Bolz

Researcher of the Month, Februar 2011

Die Jury „Researcher of the Month“ verleiht die Auszeichnung für diesen Monat Herrn Priv.-Doz. Dr. Matthias Bolz aus Anlass der Publikation „In vivo retinal morphology after grid laser treatment in diabetic macular edema“ in dem Top-Journal „Ophthalmology“ 2010; (IF 5.491). In der vorliegenden Studie wurden erstmals bei Patienten mit diabetischem Makulaödem die morphologischen retinalen Veränderungen unmittelbar nach standardisierter Grid-Laser-Behandlung mittels eines „Pattern Scan Laser System (PASCAL)“ *in vivo* mittels der „Spectral Domain Optical Coherence Tomography (SD OCT)“ untersucht.

Wissenschaftliches Umfeld

Dr. Bolz ist Leiter der Arbeitsgruppe „Diabetic Retinopathy Research Group Vienna“ (DRRG Vienna), die vor 3 Jahren gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. U. Schmidt-Erfurth gegründet wurde. Der Forschungsschwerpunkt ist die bildgebende Diagnostik im Rahmen der Therapie der diabetischen Retinopathie. DRRG Vienna hat in den letzten beiden Jahren sieben Originalarbeiten in internationalen Top-Journals publiziert. Vor der Gründung von DRRG Vienna war er als Medical Director am Aufbau des Vienna Reading Centers der Universitätsklinik für Augenheilkunde beteiligt, das sich in der Zwischenzeit als Zentrum für Auswertungen bildgebender Untersuchungen im Rahmen internationaler, multizentrischer Studien etabliert hat. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Univ.-Prof. Dr. C. Hitzenberger vom Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik der MUW, um die bildgebende Diagnostik in der klinischen Routine zu verbessern. Eine weitere Forschungs Kooperation besteht mit der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel (Leiter: Univ.-Prof. Dr. A. Luger). Dr. Bolz ist stellvertretender Leiter der Diabetes-Ambulanz der Augenklinik unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. C. Scholda.

Morphologische Veränderung nach Grid-Laser-Behandlung bei Patienten mit „Diabetischer Makulopathie“

Die optische Kohärenztomographie (OCT) hat in der Diagnostik retinaler Erkrankungen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und neben den bisher standardmäßig eingesetzten diagnostischen Verfahren, wie zum Beispiel der Fluoreszenzangiographie, eine wichtige Rolle in der klinischen Augenheilkunde eingenommen. Waren mit der OCT bisher nur zweidimensionale Laserscans mit Bildern in mäßiger Auflösung durchführbar, so erlaubt die weiterentwickelte Technik einen vorgegebenen retinalen Bereich von 6 × 6 Millimeter mit Raster-B-Scans abzutasten und damit die dreidimensionale Analyse aller Netzhautschichten in hoher, detailgetreuer Auflösung.

Auch in der Diagnostik der diabetischen Makulopathie hat die OCT in den vergangenen 5 Jahren einen zentralen Stellen-

wert gewonnen. In der oben erwähnten Studie wurden Effekte einer Netzhautlasertherapie auf die Morphologie des diabetischen Makulaödems des Menschen *in vivo* erstmals beschrieben. Die Netzhautlasertherapie ist seit circa drei Jahrzehnten „state of the art“ in der Therapie des diabetischen Makulaödems, obwohl der genaue Wirkmechanismus bis heute nicht zur Gänze geklärt ist. In der vorliegenden Studie zeigte sich, dass die Applikation eines einzelnen Laserherds zu einer lokalen Koagulation des Photorezeptor-Außensegmentes und konsekutiv zu einer Apoptose der gesamten Zelle führt. Im OCT wird das durch das Auftreten einer scharf begrenzten, hyperreflektiven Zone in den äußeren Netzhautschichten deutlich, die wiederum charakteristischen zeitlichen Veränderungen unterliegt. Durch die hohe Auflösung konnte durch den Nachweis der apoptotisch bedingten Hyperreflektivität im OCT Bild der exakte Verlauf der Photorezeptorzellen in ihrer Gesamtheit durch die äußeren Netzhautschichten erstmals analysiert werden.

Aufbauend auf dieser Arbeit konnten in weiterer Folge Effekte der Laserbehandlung auf die intraretinale Verteilung der Mikroexsudate, entsprechend kleinsten Ansammlungen von Lipoproteinen und Makrophagen, erstmals beschrieben werden. In weiterer Folge können anhand dieser Ergebnisse auch die Effekte unterschiedlicher Laserquellen und -behandlungen auf die Morphologie der menschlichen Netzhaut miteinander verglichen werden.

Bolz M, Kriechbaum K, Simader C, Deák GG, Lammer J, Treu C, Scholda C, Prunte C, Schmidt-Erfurth U. In vivo retinal morphology following grid laser treatment in diabetic macular edema. *Ophthalmology* 2010;117(3):538–44. [Epub 2010 Jan 4].

Kontakt: Priv. Doz. Dr. Matthias Bolz, Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Österreich, E-mail: matthias.bolz@meduniwien.ac.at

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Medizinischen Universität Wien, www.meduniwien.ac.at