psychopraxis.neuropraxis 2017 · 20:140
DOI 10.1007/s00739-017-0395-5
Online publiziert: 11. April 2017
© Springer-Verlag Wien 2017

Lucie Bartova · Gabriele Sachs

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich

Erratum zu: Depotbehandlung bei ersterkrankten Patienten mit Schizophrenie

Kasuistik einer Studentin mit raschem Therapieansprechen und guter Lebensqualität

Erratum zu:

psychopraxis.neuropraxis (2017) 20: 52–59

DOI 10.1007/s00739-017-0382-x

In der ursprünglich veröffentlichten Online-Version des Originalbeitrages wurde versehentlich in **Tab. 1**, linke Spalte das Wort Aripiprazol verwendet, anstatt Aripiprazol. Die korrekte Version ist hier abgebildet.

Korrespondenzadresse

Dr. L. Bartova

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18–20, Wien, Österreich
lucie.bartova@meduniwien.ac.at

a.o. Univ.-Prof. Dr. Dr. G. Sachs

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18–20, Wien, Österreich
gabriele.sachs@meduniwien.ac.at

Tab. 1 Dosierung von Antipsychotika [1]

Substanz	Empfohlene Startdosis (mg/Tag)	DI ^a	Zieldosis Erst-erkrankte (mg/Tag)	Zieldosis Mehrfacherkrankte (mg/Tag)	Höchste empfohlene Dosis (mg/Tag) ^b
Atypika					
Amisulprid	200	(1)–2	100–300	400–800	1200
Aripiprazol	(10)–15	1	15–(30)	15–30	30
Clozapin ^c	25	2–(4)	100–250	200–450	900
Olanzapin	5–10	1	5–15	5–20	20
Paliperidon	6	1	6–9	9–12	12
Quetiapin	50	2	300–600	400–750	750
Risperidon	2	1–2	1–4	3–6–(10)	16
Ziprasidon	40	2	40–80	80–160	160
Klassische Neuroleptika					
Haloperidol	1–10	(1)–2	1–4	3–15	100

^aDI (Dosierungsintervall): Empfohlene Verteilung der genannten Gesamtdosis über den Tag; Ein Zeitpunkt = 1, zwei Zeitpunkte = 2 usw.; Höchstdosierungen müssen ggf. auf mehrere Zeitpunkte verteilt werden

^bHöchste zugelassene Dosis nach Angaben der Fachinformationen. Insbesondere bei neueren Antipsychotika werden jedoch auch in der klinischen Praxis oft höhere Dosen verwendet („off-label use“) und positive Erfahrungen damit (kasuistisch) berichtet

^cClozapin wird üblicherweise nicht zur Behandlung von Ersterkrankten eingesetzt

Mit freundl. Genehmigung der Medizin Medien Austria GmbH. Quelle: Leitlinien der DGPPN [13] und der WFSBP [10]

Die Online-Version des Originalbeitrages finden Sie unter doi: [10.1007/s00739-017-0382-x](https://doi.org/10.1007/s00739-017-0382-x)