Nierenzellkarzinom

Viel erreicht – noch viel zu tun

Die Häufigkeit des Nierenzellkarzinoms (NZK) ist in den letzten Jahren weltweit kontinuierlich angestiegen und steht mit einem Anteil von 2–3% aller Krebsneuerkrankungen bei Männern an 8. und bei Frauen an 10. Stelle aller malignen Tumoren. Das NZK ist eine sehr heterogene Erkrankung, die sich in mehrere histologische Subtypen mit unterschiedlichem klinischem Verlauf einteilen lässt. Diese Einteilung wird laufend den neuen Erkenntnissen angepasst. Die häufigste Entität mit ca. 75% ist das klarzellige NZK, gefolgt vom papillären NZK Typ I und II, dem chromophoben NZK und weiteren Entitäten. Die diversen Entitäten sind mit unterschiedlichen chromosomalen und molekularen Aberrationen assoziiert.

» Bei klinischer Machbarkeit sind „nierensparende“ Verfahren im Vergleich zur radikalen Nephrektomie gleichwertig oder überlegen

Im lokalisierten Stadium galt die radikale Nephrektomie lange Zeit als der Goldstandard. Zahlreiche Studien zeigten jedoch, dass die Nephrektomie langfristig mit relevanten Komorbiditäten vergesellschaftet sein kann und bei klinischer Machbarkeit sog. „nierensparende“ Verfahren wie die Nierenteilresektion oder Nierentumorenukleation dem klassischen Vorgehen in Outcome, Rezidivrate und Komplikationsrate bei verbessertem Comorbidity-Index gleichwertig oder sogar überlegen sind.

Im metastasierten Stadium galten Zytokine wie Interferon- α und Interleukin-2 viele Jahre als Standardtherapie. Inzwischen konnte jedoch mit neuen, sog. zielgerichteten Substanzen wie den Tyrosinkinasehemmern (TKI) Sunitinib, Pazopanib, Axitinib und Sorafenib, den mTOR-Inhibitoren Temsirolimus und Everolimus sowie dem VEGF-Antikörper Bevacizumab in Kombination mit Interferon- α die Prognose auch im metastasierten Stadium signifikant verbessert werden.

» Neue Therapieoptionen bieten möglicherweise die „Immunecheckpoint-Inhibitoren“

Die Frage nach der optimalen Sequenz ist trotz Phase-III-Studien bei fehlenden prädiktiven Faktoren noch nicht definitiv geklärt. Mögliche neue vielversprechende Therapieoptionen eröffnen sich mit den „Immunecheckpoint-Inhibitoren“.

Man kann ohne Übertreibung von einer stetigen Verbesserung der therapeutischen Optionen und deren Wirksamkeit sprechen. Dennoch bleibt in translationaler und klinischer Forschung viel zu tun, um die düstere Prognose der Erkrankung, die früher oft erst im fortgeschrittenen, unheilbaren Stadium diagnostiziert wurde, so zu ändern, dass von einem Durchbruch gesprochen werden kann.

Das vorliegende Themenheft soll über die aktuellen Entwicklungen und die aktuellen Therapieoptionen von der Pathophysiologie und Pathologie über operative Verfahren, Strahlentherapieindikationen

und insbesondere die zielgerichtete systemische Therapie informieren.

Für die Schriftleiter des Schwerpunktthemas

L. Bergmann

Lothar Bergmann

Für die Herausgeber

K. Höffken

Klaus Höffken

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. L. Bergmann
Medizinische Klinik II,
Universitätsklinikum Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt
L.Bergmann@
em.uni-frankfurt.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. L. Bergmann und K. Höffken geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Hier steht eine Anzeige.