Onkologe 2016 · 22:350
DOI 10.1007/s00761-016-0037-1
Online publiziert: 18. April 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

T. J. Ettrich · T. Seufferlein

Klinik für Innere Medizin I, Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Deutschland

Erratum zu: Metastasiertes kolorektales Karzinom

Moderne Therapiekonzepte zwischen Heute und Morgen

Erratum zu:

Der Onkologe 2016/2:109–114

DOI 10.1007/s00761-015-3010-5

In **Tab. 3** sind die 3 Angaben zum mittleren Gesamtüberleben für die VELOUR-Studie nicht korrekt. Bitte beachten Sie die hier korrigierten Daten (fett ausgezeichnet).

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. T. Seufferlein

Klinik für Innere Medizin I, Universitätsklinikum Ulm
Albert-Einstein-Allee 23, 89081 Ulm, Deutschland
thomas.seufferlein@uniklinik-ulm.de

Tab. 3 Übersicht wichtiger VEGF-Inhibitor-Studien beim mKRK in der Zweitlinientherapie							
Studie	Phase	Therapie- linie	Schema	Patienten- zahl (n)	mPFS (Monate)	mOS (Monate)	Referenz
ECOG E3200	3	Zweitlinie	FOLFOX	291	4,7	10,8	[7]
			FOLFOX + Bev	286	7,3	12,9	
			Bev	243	2,7	10,2	
ML18147	3	Zweitlinie	Chemotherapie	411	5,7	11,2	[2]
			Chemotherapie + Bev	411	4,1	9,8 HR 0,81	
VELOUR	3	Zweitlinie	FOLFIRI + Plc	614	3,9	12,1	[25]
			FOLFIRI + Afl	612	6,7 HR 0,66	13,5 HR 0,82	
RAISE	3	Zweitlinie	FOLFIRI + Plc	536	5,7	11,7	[26]
			FOLFIRI + Ram	536	4,5 HR 0,79	13,3 HR 0,84	

mPFS mittleres progressionsfreies Überleben, *mOS* mittleres Gesamtüberleben, *Bev* Bevacizumab, *Plc* Placebo, *Afl* Afibercept, *Ram* Ramucirumab, *FP* Fluoropyrimidin, *HR* Hazard Ratio

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00761-015-3010-5> zu finden.