Therapiealgorithmus für Patienten mit Hodgkin-Lymphom

Abb. 1 ▲ Therapiealgorithmus für Patienten mit Hodgkin-Lymphom. Er gilt nicht für das NLPHL (nodulär lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom) im Stadium IA, das ausschließlich bestrahlt wird (30 Gy in IFRT). Risikofaktoren sind **a** großer Mediastinaltumor, **b** Extranodalbefall, **c** erhöhte BSG, **d** ≥ 3 befallene Areale. ABVD Adriamycin, Bleomycin, Vinblastin, Dacarbazin, BEACOPP Bleomycin, Etoposid, Adriamycin, Cyclophosphamid, Vincristin, Procarbazin, Prednison, ISRT Involved-side-Radiotherapie, PET Positronenemissionstomographie, RF Risikofaktor, RT Radiotherapie

Korrespondenzadresse

**Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c.
A. Engert**

German Hodgkin Study
Group, Universitätsklinik Köln,
Klinik I für Innere Medizin
Kerpener Straße 62,
50937 Köln, Deutschland
a.engert@uni-koeln.de

Interessenkonflikt. A. Engert gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.