S3-Leitlinie Extracranielle Carotisstenose

Kapitel 8.19: Welche Anforderungen an Weiterbildung und Strukturqualität ist an Einrichtungen zu stellen, in denen Angiographien oder operative/endovaskuläre Revaskularisationen der A. carotis durchgeführt werden?

Gesellschaftszugehörigkeit

Joachim Berkefeld: Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR)

Arnd Dörfler: Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR)

Martin Storck: Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin – Gesellschaft für operative, endovaskuläre und präventive Gefäßmedizin e. V. (DGG)

8.19.1 Empfehlungen

Siehe ■ Tab. 1.

8.19.2 Literatur (Leitlinien, Reviews, Studien), Bewertung der Evidenz und offene Fragen

Anforderungen an Weiterbildung und Strukturqualität zur CEA

Leitliniensynopse und systematische

Reviews: Die wissenschaftlichen LL äußern sich nicht zur Strukturqualität einer Einrichtung bzw. eines Krankenhauses, in welchem operative Carotiseingriffe durchgeführt werden. In der aktuellen

amerikanischen LL wird „davon ausgegangen“, dass der Operateur >20 Eingriffe (CEA oder CAS) selbstständig durchgeführt hat [1, 2]. Siehe ■ Tab. 10 und ■ Tab. 11 in der Onlineversion unter <http://www.awmf.org>.

RCTs und sonstige Studien: In den publizierten Studien zum Vergleich CEA vs. CAS wird meistens in der Diskussion auf die Strukturqualität der Einrichtungen bzw. auf die Erfahrungen der Interventionalisten abgehoben, ohne dass das Ergebnis der Chirurgie thematisiert wird. In der CREST-Studie wurde das bisher beste Ergebnis für die Chirurgie (3% für den klassischen Endpunkt: Schlaganfall und Tod) im Vergleich zu anderen Studien erreicht (ÄZQ-Report). So lag beispielsweise bei SPACE diese Rate doppelt so hoch, bei CAVATAS-I sogar gleich dreimal so hoch. Die Ursachen hierfür waren teilweise einzelne Zentrumsseffekte, ohne dass ein Volumeneffekt statistisch erkennbar war. Gleiches galt allerdings in der EVA-3S-Studie auch für CAS. Zu der Frage einer Nachbeobachtung auf einer IMC/IST-Station sowie andere in der Empfehlung for-

mulierten Struktureigenschaften existieren keine RCTs.

Bewertung der Evidenz und offene Fragen:

In Deutschland entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss als Untergesetzgebungsorgan über die Voraussetzung zur Abrechnung erbrachter Leistungen. Carotisoperationen können in Deutschland haftungsrechtlich derzeit von einem FA für Chirurgie, Gefäßchirurgie, Herzchirurgie oder Neurochirurgie durchgeführt werden. Im Rahmen der externen gesetzlichen Qualitätssicherung gibt es Hinweise auf negative Volumeneffekte von Krankenhäusern mit weniger als 20 Fällen, die jedoch noch nicht systematisch ausgewertet wurden (AQUA, pers. Mitteilung). In anderen Ländern konnte ein Volumeneffekt nachgewiesen werden [3] (s. Kap. 8.20). Die wissenschaftliche Klärung der Mindestmenge auf das klinische Ergebnis („out-

Die Leitlinie Extracranielle Carotisstenose; Diagnostik, Therapie und Nachsorge wird bei der AWMF unter der Register-Nummer 004-028 geführt.

Tab. 1 Welche Anforderungen an Weiterbildung und Strukturqualität ist an Einrichtungen zu stellen, in denen Angiographien oder operative/endovaskuläre Revaskularisationen der A. carotis durchgeführt werden?

Nr.	Text der Empfehlung	Grad ^a	LoE ^b
A	Empfehlungen zur CEA	GCP	–
	Aufgrund des Konsensus der Expertengruppe werden folgende Empfehlungen zur Carotischirurgie formuliert, welche nicht auf Studien beruhen		
	1. Operation durch oder unter Aufsicht eines Arztes für Gefäßchirurgie mit ausreichender Erfahrung (mind. 25 selbstständig durchgeführte Operationen)		
	2. Möglichkeit zur intraoperativen Angiographie (auch intrazerebral) bei Bedarf		
	3. 24-h-Verfügbarkeit eines in der Gefäßchirurgie erfahrenen Chirurgen		
	4. 24-h-Verfügbarkeit von Computertomographie und Duplexsonographie		
	5. 24-h-Verfügbarkeit eines in der Behandlung der zerebralen Ischämie erfahrenen neurologischen/gefäßmedizinischen Dienstes		
	6. 24-h-Verfügbarkeit eines endovaskulären Interventionsdienstes		
	7. Überwachungsmöglichkeit (Intermediate Care; Intensivstation, Stroke Unit) für Risikopatienten		
	8. Mindestens ein Chirurg mit mindestens 10 CEA-Prozeduren pro Jahr		
	Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann es im Falle von Komplikationen zu Verzögerungen von Diagnostik und Therapie kommen, die die Qualität der Einrichtung limitieren.		
B	Empfehlungen zur CAS	GCP	–
	1. Intervention durch einen klinisch und technisch qualifizierten Arzt, der zuvor mindestens 100 selektive diagnostische Katheterangiographien der hirnversorgenden Gefäße und mindestens 25 selbstständig durchgeführte supraaortalen Interventionen durchgeführt hat		
	2. Intervention durch oder unter Aufsicht eines endovaskulär tätigen Arztes mit ausreichender Erfahrung (mind. 25 selbstständig durchgeführte supraaortalen Interventionen)		
	3. 24-h-Verfügbarkeit eines neuro interventionellen Dienstes zur Durchführung einer selektiven intrakraniellen Angiographie (selektive Mikrokatheternavigation) und ggf. endovaskulären Therapie (lokale Thrombolyse, mechanische Rekanalisation)		
	4. 24-h-Verfügbarkeit von Computertomographie oder MRT		
	5. 24-h-Verfügbarkeit eines in der Behandlung der zerebralen Ischämie erfahrenen neurologischen/gefäßmedizinischen Dienstes		
	6. Überwachungsmöglichkeit (Intermediate Care, Intensivstation, Stroke Unit) für Risikopatienten		
	7. Mindestens ein endovaskulär tätiger Arzt mit mindestens 10 CAS-Prozeduren pro Jahr		
	Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann es im Falle von Komplikationen zu Verzögerungen von Diagnostik und Therapie kommen, die die Qualität der Einrichtung limitieren		

^a Grad der Empfehlung: ↑↑ = starke Empfehlung („soll“), ↑ = Empfehlung („sollte“), ↔ = Empfehlung offen („kann“), GCP good clinical practise/klinischer Konsens. ^b Level of Evidence (LoE): 1–5 nach Oxford Centre of Evidence Based Medicine (2001, s. Methodenreport zu dieser S3-LL).

come“) der Patienten ist sehr schwierig, da ein Volumeneffekt teilweise von anderen Faktoren überlagert wird, beispielsweise von der Zahl der Operateure, der speziellen Indikation sowie der Risikoadjustierung. Die Facharztspezialisierung „Gefäßchirurgie“ dagegen konnte im Vergleich zu anderen chirurgischen Fächern, die Carotischirurgie durchführen, als

positiver Faktor für ein besseres klinisches Outcome belegt werden [4].

Anforderungen an Weiterbildung und Strukturqualität zu CAS (Schlüsselfragen 3.30; 3.32)

Leitliniensynopse und systematische Reviews: Die aktuellen LL äußern sich

kaum zur Strukturqualität von CAS-Zentren. In einigen LL wird erwähnt, dass CAS-Eingriffe bevorzugt in erfahrenen „High-Volume-Zentren“ durchgeführt werden sollen (■ Tab. 17 in der Onlineversion unter <http://www.awmf.org>) [5]. Dies betrifft auch die aktuellen LL der ESC und der SVS 2011 (■ Tab. 13 und ■ Tab. 14 in der Onlineversion unter <http://www.awmf.org>). In der aktuellen amerikanischen LL wird „davon ausgegangen“, dass der Operateur >20 Eingriffe (CEA oder CAS) selbstständig durchgeführt hat [1, 2] (s. ■ Tab. 10 und ■ Tab. 11 in der Onlineversion unter <http://www.awmf.org>). Es liegen zur Kompetenz aktuell von verschiedenen Fachgesellschaften und Organisationen Stellungnahmen vor. 2009: In einem Positionspapier der American Academy of Neurology, American Association of Neurological Surgeons, American Society of Interventional and Therapeutic Radiology, American Society of Neuroradiology, Congress of Neurological Surgeons, AANS/CNS Cerebrovascular Section und der Society of Interventional Radiology (sog. „Neurovascular Coalition“, alle USA) wird die Weiterbildung in neurointerventionellen Verfahren (inkl. CAS) an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft. Hierzu gehören neben einem formalen kognitiven Training von mindestens 6 Monaten Weiterbildung auch eine Mindestanzahl von 100 supervidierten diagnostischen selektiven supraaortalen Angiographien [6]. Dies Forderung basiert auf Studien, in denen eine niedrige Komplikationsrate (<1%) der diagnostischen Katheterangiographie der supraaortalen Gefäße eindeutig mit dem Erfahrungsstand der Untersucher korrelierte. So konnte z. B. in einer Analyse von 5.000 Angiographien gezeigt werden, dass erfahrene und gut ausgebildete Untersucher eine signifikante geringere neurologische Komplikationsrate (0,5%) im Vergleich zu Ausbildungsärzten unter Supervision hatten [7, 8]. Aufgrund der schnelleren und sicheren Sondierung der supraaortalen Gefäßabgänge am Aortenbogen konnte hierbei nicht nur die Komplikationsrate, sondern auch die Durchleuchtungszeiten signifikant gesenkt werden [9].

2007/2005: In einem „Clinical Expert Consensus Document on Carotid Sten-

ting“ aus dem Jahr 2007 der American College of Cardiology Foundation (ACCF), der American Society of Interventional & Therapeutic Neuroradiology (ASITN), der Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), der Society for Vascular Medicine and Biology (SVMB) und der Society of Interventional Radiology (SIR) werden kognitive, technische und klinische Kompetenzen gefordert [10]. Basierend auf multidisziplinären Empfehlungen aus den Jahren 2003 [11] und 2005 [6] werden auch hier 100 supraaortische diagnostische Angiographien als notwendig erachtet, um sicher angiographieren zu können und CAS zu erlernen [12]. Sehr ausführlich wird zur Qualifikation des medizinischen Personals und der strukturellen Ausstattung Stellung genommen. Bezüglich der Anzahl von CAS-Prozeduren wird auf eine Publikation [12] der Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), der Society for Vascular Medicine and Biology (SVMB) und der Society for Vascular Surgery (SVS) hingewiesen, in der u. a. 30 zerebral Angiographien (davon >15 als Erstuntersucher) und 25 CAS-Prozeduren (davon ≥13 als Erstuntersucher) gefordert werden. Es wird auch auf den potenziellen Stellenwert von Simulatortraining hingewiesen.

2004: In einem weiteren „Competence-Statement on Vascular Medicine and Catheter-Based Peripheral Vascular Interventions“ des American College of Cardiology (ACC), des American College of Physicians (ACP), der Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), der Society for Vascular Medicine and Biology (SVMB) und der Society for Vascular Surgery (SVS) werden neben kognitiven Kompetenzen und einer großen Anzahl von Ultraschalluntersuchungen, 100 Angiographien in allen Gefäßterritorien (davon 50 als Erstuntersucher), 50 periphere Interventionen (PTA, Stent, davon 25 als Erstuntersucher) und 10 katetergestützte Thrombolyse/Thrombektomien gefordert. Die Eingriffe sollen gleichmäßig über alle Gefäßterritorien verteilt sein [13].

2011: Die „Intersocietal Commission for the Accreditation of Carotid Stenting Facilities (ICACSF [14])“ wird unterstützt durch folgende Fachgesellschaften und

Organisationen: American Academy of Neurology (AAN), American Association of Neurologic Surgeons and Congress of Neurologic Surgeons, American Society of Neuroradiology (ASNR), American Association of Physicists in Medicine (AAPM), Neurocritical Care Society, Society of Interventional Radiology (SIR), Society of NeuroInterventional Surgery, Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN), Society for Vascular Medicine and Biology (SVMB), Society for Vascular Surgery (SVS). In den aktuellen ICACSF Standards for the accreditation of carotid stenting facilities werden neben personellen (Ärzte, Schwestern, Techniker etc.) und strukturellen (Räume, technische Ausstattung inkl. Monitoring) Anforderungen auch die Kompetenz zur zerebralen Angiographie (s. oben) und eine Mindestanzahl von 25 CAS-Prozeduren/Institution oder mindestens 15 CAS-Prozeduren/Untersucher jeweils innerhalb der letzten 3 Jahre gefordert.

RCTs und sonstige Studien: Aus den Daten und Interpretationen der CREST-Studie und der Kritik an einigen europäischen Studien lässt sich die Notwendigkeit einer noch stärkeren Standardisierung der CAS-Prozeduren und der Anforderungen an die CAS-Anwender ableiten. So betonten die CREST-Autoren die sorgfältige Vorbereitungsphase und ein konsequentes Monitoring der Zentren, bis die Qualitätsstandards der CEA mindestens erreicht waren. Eine Subgruppenanalyse aus der SPACE-1-Studie zeigte, dass Zentren, die viele Patienten eingeschlossen hatten, im Durchschnitt weniger Komplikationen hatten als Kliniken mit wenigen eingeschlossenen Patienten [15]. Andere RCTs zeigten angeblich keinen solchen Center-Bias [16, 17].

Bewertung der Evidenz und offene Fragen: Mangelnde Erfahrung der interventionellen Behandler ist immer wieder als Ursache für das schlechte Abschneiden von CAS in randomisierten Studien diskutiert worden. Umgekehrt gibt es außerhalb der Vorgaben zur Teilnahme an RCTs keine klaren Empfehlungen zur Fallzahl und zur Qualifikation von CAS-Zentren. Analog zur Entwicklung in der Carotischirurgie, die diese Diskussio-

nen bereits in den 1980er und 1990er Jahren erlebte, und nach der Diskussion des ÄZQ-Evidenzberichts erscheinen folgende Empfehlungen vernünftig:

1. CAS-Zentren sollten eine Fallzahl von mindestens 10 Eingriffen pro Jahr und Krankenhaus aufweisen.
2. Eine extern kontrollierte Qualitätssicherung ist für alle CAS-Zentren verpflichtend.
3. CAS-Zentren sorgen für eine adäquate Ausbildung und Erfahrung der interventionellen Behandler und für die Einhaltung der für die jeweilige Einrichtung definierten technischen und klinischen Standards.

In der Leitlinienkommission wurde das Dilemma zwischen einer nach der gegenwärtigen Studienlage recht restriktiven Indikationsstellung für CAS und den Anforderungen standardisierter arbeitender „High-Volume-Zentren“ diskutiert. Die Beschränkung auf wenige Zentren oder auf Studien wird gefordert, wird aber der Versorgungsrealität nicht gerecht. Als Beginn einer besseren CAS-Strukturqualität wurden Mindestanforderungen und eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart und in den oben genannten Empfehlungen abgebildet. Seit 2012 wurde die externe gesetzliche Qualitätssicherung nach § 137 SGB V auf die Carotisstenangioplastie (CAS) ausgedehnt [18].

Korrespondenzadressen

Prof. Dr. M. Storck

Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie,
Städtisches Klinikum Karlsruhe
Moltkestr. 90, 76133 Karlsruhe
martin.storck@klinikum-karlsruhe.de

Prof. Dr. J. Berkefeld

Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie,
Hirngefäßzentrum,
Klinikum und Fachbereich Medizin, Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main
berkefeld@em.uni-frankfurt.de

Interessenkonflikt. Die korrespondierenden Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Goldstein LB, Bushnell CD, Adams RJ et al (2011) Guidelines for the primary prevention of stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke* 42:517–584
2. Brott TG, Halperin JL, Abbara S et al (2011) 2011 ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS Guideline on the management of patients with extracranial carotid and vertebral artery disease: Executive Summary A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Stroke Association, American Association of Neuroscience Nurses, American Association of Neurological Surgeons, American College of Radiology, American Society of Neuroradiology, Congress of Neurological Surgeons, Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of NeuroInterventional Surgery, Society for Vascular Medicine, and Society for Vascular Surgery Developed in Collaboration With the American Academy of Neurology and Society of Cardiovascular Computed Tomography. *J Am Coll Cardiol* 57:1002–1044
3. Shah DM, Darling RC III, Chang BB et al (2004) Analysis of factors contributing to improved outcome for carotid endarterectomy. *Semin Vasc Surg* 17:257–259
4. Huber TS, Seeger JM (2001) Dartmouth atlas of vascular health care review: impact of hospital volume, surgeon volume, and training on outcome. *J Vasc Surg* 34:751–756
5. Liapis CD, Bell PR, Mikhailidis D et al (2009) ESVS guidelines. Invasive treatment for carotid stenosis: indications, techniques. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 37:1–19
6. Connors JJ III, Sacks D, Furlan AJ et al (2009) Training, competency, and credentialing standards for diagnostic cervicocerebral angiography, carotid stenting, and cerebrovascular intervention: a joint statement from the American Academy of Neurology, the American Association of Neurological Surgeons, the American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, the American Society of Neuroradiology, the Congress of Neurological Surgeons, the AANS/CNS Cerebrovascular Section, and the Society of Interventional Radiology. *J Vasc Interv Radiol* 20:292–301
7. Grzyska U, Freitag J, Zeumer H (1990) Selective cerebral intraarterial DSA. Complication rate and control of risk factors. *Neuroradiology* 32:296–299
8. McIvor J, Steiner TJ, Perkin GD et al (1987) Neurological morbidity of arch and carotid arteriography in cerebrovascular disease. The influence of contrast medium and radiologist. *Br J Radiol* 60:117–122
9. Johnston DC, Chapman KM, Goldstein LB (2001) Low rate of complications of cerebral angiography in routine clinical practice. *Neurology* 57:2012–2014
10. Bates ER, Babb JD, Casey DE Jr et al (2007) ACCF/SCAI/SVMB/SIR/ASITN 2007 Clinical Expert Consensus Document on carotid stenting. *Vasc Med* 12:35–83
11. Barr JD, Connors JJ III, Sacks D et al (2003) Quality improvement guidelines for the performance of cervical carotid angioplasty and stent placement. *AJNR Am J Neuroradiol* 24:2020–2034
12. Rosenfield KM (2005) Clinical competence statement on carotid stenting: training and credentialing for carotid stenting—multispecialty consensus recommendations. *J Vasc Surg* 41:160–168
13. Creager MA, Goldstone J, Hirshfeld JW Jr et al (2004) ACC/ACP/SCAI/SVMB/SVS clinical competence statement on vascular medicine and catheter-based peripheral vascular interventions: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association/American College of Physician Task Force on Clinical Competence (ACC/ACP/SCAI/SVMB/SVS Writing Committee to develop a clinical competence statement on peripheral vascular disease). *J Am Coll Cardiol* 44:941–957
14. ICACSF (2011) ICACSF Standards for the Accreditation of Carotid Stenting Facilities. <http://www.icacsf.org> 2011
15. Fiehler J, Jansen O, Berger J et al (2008) Differences in complication rates among the centres in the SPACE study. *Neuroradiology* 50:1049–1053
16. Ederle J, Dobson J, Featherstone RL et al (2010) Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis (International Carotid Stenting Study): an interim analysis of a randomised controlled trial. *Lancet* 375:985–997
17. Mas JL, Chatellier G, Beyssen B et al (2006) Endarterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis. *N Engl J Med* 355:1660–1671
18. AQUA (2011) AQUA Qualitätsreport 2010