Volker Grosser¹ · Michael Wenzl¹ · Boy Bohn¹ · Christian Jürgens¹ · Hubert Erhard² ·
Werner Plinske³

¹BG-Unfallkrankenhaus Hamburg

²BGW BV Hamburg

³BGW HV Hamburg

Ökonomische Auswirkungen einer erfolgreichen sekundären Rekonstruktion im Bereich der unteren Extremität

Zusammenfassung

Die Verläufe von 25 Patienten der gesetzlichen Unfallversicherung mit Pseudarthrosen des Oberschenkels ($n = 15$) und des Unterschenkels ($n = 10$), die am BG-Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH) operativ mit winkelstabilem Implantat und Spongiosaplastik behandelt worden waren, wurden ausgewertet. Bei 80% der Oberschenkel-Pseudarthrosen und 40% der Unterschenkel-Pseudarthrosen hatte primär eine Mehrfachverletzung vorgelegen. Die Operation erfolgte am Oberschenkel durchschnittlich 18 Monate, am Unterschenkel durchschnittlich 15 Monate nach dem Unfall. Die durchschnittliche Anzahl der lokalen Voroperationen lag am Oberschenkel bei 2,5 (1–6), am Unterschenkel bei 1,9 (1–4). Alle Pseudarthrosen konnten zur knöchernen Ausheilung gebracht werden. Die Kostenersparnis aus der Differenz zwischen fiktiver Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) ohne erfolgreiche Pseudarthrosenbehandlung und tatsächlicher MdE abzüglich der stationären und ambulanten Gesamtkosten betrug bei den Oberschenkel-Pseudarthrosen pro Fall durchschnittlich 93.630 EUR (183.125 DM), bei den Unterschenkel-Pseudarthrosen durchschnittlich 41.872 EUR (81.895 DM). Die Gesamteinsparungen für die Berufsgenossenschaften und die Volkswirtschaft sind durch die erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung und den Wegfall vermehrter Behandlungsbedürftigkeit deutlich höher.

Schlüsselwörter

Ökonomische Auswirkungen · Sekundäre Rekonstruktion · Pseudarthrose · Untere Extremität

Eine zentrale Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist es, Verletzte im Rahmen des BG-lichen Heilverfahrens mit „allen geeigneten Mitteln“ medizinisch und beruflich zu rehabilitieren. Das Ergebnis des Heilverfahrens hat nicht nur eine herausragende Bedeutung für die Lebensqualität des Unfallverletzten, sondern auch große gesundheitsökonomische Auswirkungen [7, 8, 9]. Knapp 8,7 Mrd. EUR (17 Mrd. DM) mussten die Unternehmen im Jahr 2001 für die gesetzliche Unfallversicherung aufwenden [6]. Gut 7% der Gesamtausgaben wurden für die Prävention, 28% (2,6 Mrd. EUR bzw. 5,0 Mrd. DM) für die Rehabilitation aufgewandt. Den größten Teil beanspruchte die finanzielle Kompensation durch Renten oder andere Entschädigungsleistungen: 53,5% bzw. 4,9 Mrd. EUR (9,5 Mrd. DM). Die Kosten für Verwaltung und Verfahren beliefen sich auf 1 Mrd. EUR (2,0 Mrd. DM bzw. 11%). Bei erfolgloser beruflicher Reintegration kommen volkswirtschaftlich weitere Kosten hinzu, da in diesen Fällen häufig auch andere Sozialversicherungsträger wie die Arbeitslosenversicherung, die Rentenversicherung oder die Sozialhilfe eintrittspflichtig werden.

Die Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland liegen im internationalen Vergleich niedrig, obwohl die Leistungen für den Versicherten höher sind. Die Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mussten in Deutschland im Jahr 2000 1,31% der Lohnsumme als Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung entrichten, während es z. B. in den USA 1,8% waren [1, 4,

6]. Es wird diskutiert, dass zu diesem guten Abschneiden auch die im Vergleich mit anderen Ländern beispielhaften Möglichkeiten, das Heilverfahren zu steuern und medizinisch problematische Fälle spezialisierten Unfallkliniken zuzuweisen, beitragen.

Mitbedingt durch das Fehlen ausreichender empirischer Daten wird die aktuelle Kostendiskussion im Gesundheitswesen oft nur unter dem Aspekt kurzfristiger Einsparungen geführt. Dabei wird häufig zu wenig beachtet, dass eine optimale Versorgung durch die Reduzierung von Unfallfolgekosten langfristig das größte Einsparpotenzial bietet. In dieser Studie wurden deshalb am Beispiel von Pseudarthrosen des Ober- und Unterschenkels die ökonomischen Auswirkungen wiederherstellender Eingriffe im Bereich der unteren Extremität untersucht.

Material und Methode

In die Studie einbezogen wurden sämtliche Fälle, welche folgende Einschlusskriterien erfüllten:

- Pseudarthrose des Ober- bzw. Unterschenkels
- Sanierungsoperation am BG-Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH) mit

Dr. Volker Grosser

BG-Unfallkrankenhaus Hamburg,
Bergedorferstraße 10, 21033 Hamburg,
E-Mail: V.Grosser@buk-hamburg.de,
Tel: 040-73062741, Fax: 040-73061700

V. Grosser · M. Wenzl · B. Bohn · C. Jürgens ·
H. Erhard · W. Plinske

Economic implications of successful secondary recon- struction in the lower extremity

Abstract

The courses of 25 patients insured with the German employers' compensation insurance who were treated at the Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH) for nonunions of the femur ($n = 15$) or the tibia ($n = 10$) by implantation of plates with angular stability and spongiosa grafts were evaluated. In 80% of the patients with femoral and 40% of the patients with tibial nonunion multiple injuries had initially been present. The mean duration from the accident to the operation was 18 months for the femoral and 15 months for the tibial nonunions. The mean number of local previous operations was 2.5 (1–6) for the patients with femoral and 1.9 (1–4) for those with tibial nonunions. In all cases bony union was achieved. The savings realized through the difference between the imaginary partial disability (MdE) without successful treatment of the nonunion and the real MdE minus the total inpatient and outpatient treatment costs averaged 93,630 EUR (183,125 DM) per case for the femoral and 41,872 EUR (81,895 DM) per case for the tibial nonunions. Due to the successful vocational rehabilitation and lack of increased need for treatment the total savings for the insurance and the national economy are markedly higher.

Keywords

Economic implications · Secondary reconstruction · Nonunion · Lower extremity

winkelstabilem Implantat (Druckplattenfixateur bzw. TiFix®) und Spongiosaplastik

- Patient der gesetzlichen Unfallversicherung
- Erhebungszeitraum:
 1. Oberschenkel 3.10.1993 (Einführung DPF) bis 31.12.1999
 2. Unterschenkel 22.9.1997 (Einführung TiFix®) bis 31.12.1999

Pseudarthrosen, die mit anderen Implantaten wie z. B. Marknägeln oder mit Fixateur-externe-Systemen versorgt wurden, waren nicht Gegenstand dieser Studie. Bei dem hier untersuchten Kollektiv handelte es sich überwiegend um oligotrophe und arthrophe Pseudarthrosen ohne floriden Infekt.

Die Einschlusskriterien wurden von insgesamt 15 Oberschenkel-Pseudarthrosen und 10 Unterschenkel-Pseudarthrosen erfüllt. Mit 2 Ausnahmen waren alle Patienten unserer Klinik von auswärts zur Pseudarthrosen-Operation zugewiesen worden. Bei den beiden an unserer Klinik erstversorgten Fällen handelte es sich einmal um eine drittgradig offene Unterschenkelfraktur und einmal um eine Oberschenkelstückfraktur bei Polytrauma, welche beide primär mit Fixateur externe stabilisiert worden waren. Der Versuch, die Frakturen im Fixateur auszubehandeln, führte zur Pseudarthrose.

Das durchschnittliche Alter der Patienten zum Unfallzeitpunkt betrug bei den Oberschenkel-Pseudarthrosen 36,3 Jahre (16–67 Jahr).

Bei 80% der Patienten mit Oberschenkel-Pseudarthrosen und bei 40% der Patienten mit Unterschenkel-Pseudarthrosen lagen primär Mehrfachverletzungen vor.

Die Zahl der lokalen Voroperationen betrug bei den Oberschenkel-Pseudarthrosen im Durchschnitt 2,5 mit einem Maximum von 6. In 7 Fällen waren ≥ 3 lokale Voroperationen durchgeführt worden. Am Unterschenkel betrug die Zahl der lokalen Voroperationen im Durchschnitt 1,9, mit einem Maximum von 4. In 3 Fällen waren ≥ 3 lokale Voroperationen durchgeführt worden.

Die Arbeitsunfähigkeitszeiten der Patienten vor und nach der Pseudarthrosen-Operation im BUKH sowie das Ergebnis der beruflichen Wiedereingliederung wurden anhand der Krankenun-

terlagen des BUKH und der BG-Unterlagen ermittelt.

Die Ersparnis durch die Verringerung der MdE abzüglich der stationären und ambulanten Gesamtkosten für die Pseudarthrosen-Operation am BUKH wurde berechnet. In die Behandlungskosten ging dabei auch die erforderliche physiotherapeutische Nachbehandlung ein. Für die Kosten der Behandlung am BUKH und die MdE nach Pseudarthrosen-Operation konnten tatsächliche Werte zugrunde gelegt werden. Die Höhe der MdE, welche bei nicht erfolgter Pseudarthrosen-Operation verblieben wäre, wurde fiktiv nach den üblichen Begutachtungskriterien [2, 5, 10, 11] festgelegt. Die Kosten der Rentenzahlungen wurden auf der Grundlage des Kapitalwerts der Unfallrenten nach den Abfindungstabellen nach §76 SGB VII berechnet. Da der tatsächliche Jahresarbeitsverdienst der Unfallverletzten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bekannt war, erfolgte die Berechnung auf der Grundlage eines mittleren Jahresarbeitsverdiensts (zum Zeitpunkt des Arbeitsunfalls maßgebende Bezugsgröße nach §18 SGB IV).

Ergebnisse

Tabelle 1 zeigt für die einzelnen Patienten mit Oberschenkel-Pseudarthrose, wie viele Monate zwischen Unfall und Pseudarthrosen-Operation im BUKH lagen und wie viele Monate davon die Patienten arbeitsunfähig waren. Die meisten Patienten waren bis zur Zuweisung an unsere Klinik durchgehend arbeitsunfähig. Die Ausnahmen ergeben sich einmal aus der besonderen beruflichen Situation – Patient 5 war Schüler – und in den anderen Fällen (Patient 2, 3 und 7) daraus, dass bei einliegendem Osteosynthesematerial bis zum Materialbruch trotz fortbestehender Pseudarthrose vorübergehend stabile Verhältnisse bestanden hatten.

Tabelle 2 zeigt die Dauer vom Unfall bis zur Pseudarthrosen-Operation im BUKH für die Patienten mit Unterschenkel-Pseudarthrose. Die Patienten waren während dieses Zeitraums bis auf 1 Ausnahme durchgehend arbeitsunfähig. Die Ausnahme (Patient 1) war darauf zurückzuführen, dass die Unterschenkel-Pseudarthrose durch einen einliegenden Marknagel bis zum Bruch desselben ausreichend stabilisiert war, sodass eine Belastung möglich war.

Fehlheilungen

Tabelle 1

Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit bei Oberschenkel pseudarthrosen

Nr.	Ge- schlecht	Alter zum Unfall- zeit- punkt [Jahre]	Mono-/ Mehrfachverletzung	Dauer Unfall bis Pseud- arthrosen- operation am BUKH [Monate]	Arbeitsun- fähigkeit vor der Pseud- arthrosen- operation am BUKH [Monate]	Arbeitsun- fähigkeit nach der Pseud- arthrosen- operation am BUKH [Monate]	Beruf bis Unfall	Berufliche Wiedereingliederung
1	w	31	Monoverletzung	48	48	12	Bandabnehmerin in Kerzenfabrik	Arbeitslos
2	m	67	Mehrfachverletzung	43	31	6	Handelsvertreter	Rentner
3	m	19	Mehrfachverletzung	32	8	9	Elektriker	Alter Beruf
4	m	30	Monoverletzung	30	30	13	Eisenbieger	Umschulung
5	m	16	Mehrfachverletzung	25			Schüler	Alter Beruf
6	m	67	Monoverletzung	14	14	23	Rentner mit Nebentätigkeit	Rentner
							Landschaftsgärtner	
7	m	53	Mehrfachverletzung	13	6	6	Berater ohne körperliche Belastung	Alter Beruf
8	m	26	Mehrfachverletzung	13	13	8	Monteur in Rohrmontage	Alter Beruf
9	m	33	Mehrfachverletzung	11	11	13	Koch	Alter Beruf
10	m	30	Monoverletzung	9	9	7	Elektroinstallateur	Alter Beruf
11	m	21	Mehrfachverletzung	8	8	6	Student	Alter Beruf
12	m	45	Mehrfachverletzung	8	8	4	Bauunternehmer	Alter Beruf
13	m	31	Mehrfachverletzung	6	6	14	Gebäudereiniger	Handelsvertreter
14	w	47	Mehrfachverletzung	6	6	22	Verkäuferin	Erwerbsunfähig- keitsrente beantragt
15	m	39	Mehrfachverletzung	6	6	9	Arzt im Praktikum	Alter Beruf

Sämtliche Pseudarthrosen konnten zur knöchernen Ausheilung gebracht werden. Bei den Unterschenkel pseudarthrosen gelang dies in allen Fällen mit einem operativen Eingriff. Bei den Oberschenkel pseudarthrosen waren bei 2 Patienten Zweiteingriffe erforderlich:

1. geplante 2. Spongiosaplastik 6 Wochen nach dem Ersteingriff
2. Reosteosynthese mit Druckplattenfixateur nach Plattenbruch 4 Monate nach dem Ersteingriff aufgrund vorzeitiger Vollbelastung durch den Patienten

Der Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit erfolgte bei den Oberschenkel pseudarthrosen durchschnittlich 10,5 Monate nach der operativen Behandlung an unserer Klinik, am Unterschenkel durchschnittlich nach 8,1 Monaten. 60% der Patienten mit Oberschenkel pseudarth-

Tabelle 2

Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit bei den Unterschenkel pseudarthrosen

Nr.	Ge- schlecht	Alter zum Unfall- zeit- punkt [Jahre]	Mono-/ Mehrfachverletzung	Dauer Unfall bis Pseud- arthrosen- operation am BUKH [Monate]	Arbeitsun- fähigkeit vor der Pseud- arthrosen- operation am BUKH [Monate]	Arbeitsun- fähigkeit nach der Pseud- arthrosen- operation am BUKH [Monate]	Beruf bis Unfall	Berufliche Wiedereingliederung
1	m	18	Mehrfachverletzung	50	3	7	Gas-/Wasserinstallateur	Alter Beruf
2	m	42	Mehrfachverletzung	26	26	7	Elektromonteur	PC-Arbeitsplatz
3	m	38	Monoverletzung	21	21	9	Maurer	Alter Beruf
4	w	39	Monoverletzung	10	10	12	Gemeindeschwester	Alter Beruf
5	w	22	Monoverletzung	8	8	6	Zahntechnikerin	Alter Beruf
6	w	52	Mehrfachverletzung	8	8	7	Fotografin	Alter Beruf
7	m	28	Monoverletzung	7	7	5	Ungelernter Dachdecker	Ungelernter KFZ-Mechaniker
8	m	33	Monoverletzung	7	7	8	Hilfsarbeiter	Alter Beruf
9	m	34	Monoverletzung	7	7	8	Baumaschinist	Staplerfahrer
10	w	39	Mehrfachverletzung	6	6	5	Sachbearbeiterin	Alter Beruf

Abb. 1 ▲ Auswirkungen der Pseudarthrosen Sanierung am Oberschenkel auf die MdE, schwarze Balken fiktive MdE ohne Pseudarthrosen Sanierung, graue Balken tatsächlich verbliebene MdE

rosen und 70% der Patienten mit Unterschenkel pseudarthrosen nahmen ihren alten Beruf wieder auf (Tabelle 1, 2).

Bei allen Patienten konnte durch die Pseudarthrosen Sanierung am Oberschenkel die MdE verringert werden (Abb. 1). Am stärksten reduzierte sich die MdE erwartungsgemäß bei denjenigen Patienten, bei denen keine Mehrfachverletzung vorlag und bei denen die Pseudarthrose am Oberschenkel noch nicht so lange bestand, dass ausgeprägte irreversible Einsteifungen von Gelenken eingetreten waren.

Bei 13 der 15 Oberschenkel pseudarthrosen ergab sich durch die Verminderung der MdE eine deutliche Nettoersparnis (Abb. 2). Bei den beiden Fällen ohne Ersparnis (Patient 11 und 12) han-

delte es sich um Patienten, bei denen trotz Pseudarthrosen Sanierung aufgrund der vorhandenen Begleitverletzungen die Reduzierung der MdE nur vergleichsweise gering war. Die durchschnittliche Ersparnis pro Fall allein durch die Verringerung der MdE betrug 93.630 EUR (183.125 DM).

Am Unterschenkel wurde bis auf eine Ausnahme bei allen Patienten eine Verringerung der MdE durch die Pseudarthrosen Sanierung erreicht (Abb. 3). Bei Patientin 6 kam es in der Gesamtschau nicht zu einer Verringerung der MdE, da gleichzeitig erhebliche Begleitverletzungen am Sprunggelenk und Fuß sowie ein schwerer Nervenschaden nach unfallbedingter Durchtrennung des N. peroneus vorlagen. Da die Beobach-

tungszeiten nach der Pseudarthrosen Sanierung am Unterschenkel z. T. noch relativ kurz sind, könnten sich bei Rentennachprüfungen noch weitere Minderungen der MdE ergeben.

Mit Ausnahme der Patientin 6 wurden bei allen Unterschenkel pseudarthrosen die Kosten für die Pseudarthrosen Sanierung allein durch die Ersparnis aus der Minderung der MdE mehr als ausgeglichen (Abb. 4). Die hierdurch erzielte durchschnittliche Ersparnis pro Fall betrug etwa 41.872,25 EUR (81.895,00 DM).

Diskussion

Die Studie bestätigt, dass Pseudarthrosen des Ober- und Unterschenkels an spezialisierten Kliniken auch beim Vorliegen ungünstiger Prognosefaktoren wie mehrfachen erfolglos vorangegangenen Sanierungsversuchen zur Ausheilung gebracht werden können. Voraussetzung für den Erfolg der Therapie ist eine ausreichende Erfahrung mit der technischen Durchführung und der individuellen Indikation der verschiedenen operativen Behandlungsmöglichkeiten bei Pseudarthrosen, welche von Spongiosaplastiken über die Marknagelung, Platten und winkelstabile Implantate bis hin zur Fixateur-externe-Behandlung und zum Segmenttransport mit Ilizarov-Fixateur reichen. Insbesondere bei bereits länger bestehenden Pseudarthrosen hängt der Gesamterfolg wesentlich auch von der Qualität der physiotherapeutischen Nachbehandlung und der Vorbereitung der beruflichen

Abb. 2 ◀ Ersparnis durch die Verringerung der MdE abzüglich der Kosten für die Pseudarthrosen Sanierung am Oberschenkel [DM] (schwarze Balken), graue Balken aus Reduzierung der MdE folgende Ersparnis [DM], dunkelgraue Balken Gesamtkosten der Pseudarthrosen Sanierung am BUKH

Abb. 3 ▲ Auswirkungen der Pseudarthrosensanierung am Unterschenkel auf die MdE, schwarze Balken fiktive MdE ohne Pseudarthrosensanierung, graue Balken tatsächlich verbliebene MdE

Wiedereingliederung bereits während des laufenden Heilverfahrens ab.

Unsere Untersuchung zeigt, dass die Kosten der Pseudarthrosensanierung am Ober- und Unterschenkel einschließlich der erforderlichen Nachbehandlung bereits durch die Ersparnis aus der Minderung der MdE mehr als ausgeglichen werden. Die allein hieraus resultierende durchschnittliche Nettoersparnis pro Fall betrug

- am Oberschenkel 93.630 EUR (183.125 DM) und
- am Unterschenkel 41.872 EUR (81.895 DM),

obwohl die Berechnungsgrundlagen bewusst konservativ gewählt wurden. Die Gesamteinsparungen für die Berufsge-

nossenschaften und die Volkswirtschaft sind deutlich höher. So führt die erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung zu einer erheblichen Verringerung der Folgekosten. Es ist auch zu berücksichtigen, dass weiterbestehende Pseudarthrosen mit einer vermehrten Behandlungsbedürftigkeit einhergehen: Beispielhaft seien hier nur die Kosten für die Versorgung mit Gehapparaten genannt.

Fehlgeschlagene Sanierungsversuche belasten die Patienten, verschlechtern meist die lokale biologische Situation, verlängern das Heilverfahren und erhöhen die Kosten. Während in dem hier untersuchten Kollektiv der Oberschenkel pseudarthrosen nach Arbeitsunfällen die durchschnittliche Zahl der lokalen Voroperation 2,5 mit einem Ma-

ximum von 6 betrug, waren es im Gesamtkollektiv der an unserer Klinik mit winkelstabilem Implantat versorgten Oberschenkel pseudarthrosen – also einschließlich der Kassenpatienten – 4,3 mit einem Maximum von 9 [3]. Die Kassenpatienten hatten also im Schnitt erheblich mehr erfolglose operative Sanierungsversuche hinter sich gebracht als die Arbeitsunfallpatienten, bevor sie unserer Klinik zugewiesen wurden. Dies weist darauf hin, dass sich bei den Arbeitsunfällen die Steuerung des Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaften positiv ausgewirkt hat, wobei es aber auch hier noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Nach unserer Einschätzung sollten Patienten mit Pseudarthrosen möglichst frühzeitig einer spezialisierten Klinik konsiliarisch vorgestellt und ggf. zugewiesen werden. Die besten Ergebnisse werden sich erzielen lassen, wenn dies bereits bei verzögerten Knochenbruchheilungen ohne wesentliche Heilungstendenz 4–6 Monate nach dem Unfall erfolgt. Bei langstreckigen Knochendefekten, bei denen ohne spezielle Maßnahmen ein Ausbleiben der knöchernen Heilung von vornherein absehbar ist, sollte die Vorstellung so unfallnah wie möglich erfolgen. Im Hinblick auf die Einführung der Fallpauschalen (DRG) sollte sichergestellt werden, dass auch in Zukunft ausreichende Kapazitäten für die optimale Wiederherstellung von Unfallverletzten zur Verfügung stehen und medizinisch angezeigte aufwändige Behandlungen für die übernehmende Klinik nicht zu einem finanziellen Risiko werden.

Abb. 4 ◀ Ersparnis durch die Verringerung der MdE abzüglich der Kosten für die Pseudarthrosensanierung am Unterschenkel [DM] (schwarze Balken), graue Balken aus Reduzierung der MdE folgende Ersparnis [DM], dunkelgraue Balken Gesamtkosten der Pseudarthrosensanierung am BUKH

Literatur

1. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor (1999) Employers costs for medicare, workers compensation rise from 1966–98. <http://stats.bls.gov/opub/ted/1999/apr/wk4/art03.htm>
2. Erlinghagen N, Ludolph E (2001) „Gesamt-MdE“. In: Ludolph E, Lehmann R, Schürmann J (Hrsg) Kursbuch der ärztlichen Begutachtung, 10. Erg Lfg. Ecomed, Landsberg, Kap III-1.10.4: 1–3
3. Faschingbauer M, Pinggen O, Wenzl M, Jürgens Ch (2003) Rekonstruktion und Stabilisierung nach fehlverheilten Frakturen und Pseudarthrosen im Femurbereich mit winkelstabilen Implantaten. Trauma Berufskrankh 5 [Suppl 1]: S62–S66
4. Grosser V (2000) Bericht über den „4th International Congress on Medical-Legal Aspects of Work Injuries“ in Toronto. Trauma Berufskrankh 2: 130–131
5. Grosser V, Wenzl M (im Druck) Spezielle Aspekte bei der Begutachtung persistierender Pseudarthrosen. In: Kortmann HR (Hrsg) Gutachtenkolloquium 16. Springer, Berlin Heidelberg New York
6. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (2001) Reizthema Kosten: Sind die Berufsgenossenschaften zu teuer? <http://www.hvbg.de/d/pages/presse/preme/kosten.htm>
7. König H-H (2001) Zur Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen. Versicherungsmed 53: 157–158
8. Mehrhoff F, Weber-Falkensammer H (2000) Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen zur Heilbehandlung und Rehabilitation in der gesetzlichen Unfallversicherung. BG 2: 104–111
9. Morger W (1999) Rehabilitation in Europa. BG 10: 603–608
10. Rompe G (1998) Synopse der Bewertung von Leistungsbeeinträchtigungen in verschiedenen Gebieten der Sozialversicherung in Deutschland. In: Rompe G, Erlenkämper H (Hrsg) Begutachtung der Haltungs- und Bewegungsorgane. Thieme, Stuttgart New York, S 421–431
11. Schönberger A, Mehrtens G, Valentin H (1998) Arbeitsunfall und Berufskrankheit. Schmidt, Berlin, S 443–446

Sehnen- und Bandverletzungen

Ch. Krettek

Unfallchirurgische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover

Unfallchirurgie in Australien

Ist alles anders als bei uns?

Autor hat kein Manuskript eingereicht