ÉDITORIAL

A. Roche

Department of Medical Imaging, institut Gustave-Roussy, 39, rue Camille-Desmoulins, F-94800 Villejuif, France

Correspondance : alain.roche@igr.fr

L'allongement constant de l'espérance de vie, constaté depuis plusieurs décennies dans les pays industrialisés, entraîne de fait une augmentation du nombre de cancers dans la population. S'il est vrai que le parcours du malade passe presque inmanquablement par une structure de soins spécialisée, l'imagerie reste néanmoins un acteur primordial impliqué en amont (diagnostic initial, dépistage), aussi bien que dans la prise en charge thérapeutique (radiologie interventionnelle, thérapeutique) que dans le suivi des patients traités.

À ce jour, un peu plus de 50 % des cancers peuvent être guéris (tous types de cancers confondus). Cette guérison est obtenue dans 75 % des cas grâce à la chirurgie seule ou à l'association chirurgie-radiothérapie, indiquant que les traitements locaux ou locorégionaux restent les piliers de la guérison. Indiquant aussi que le diagnostic précoce de lésions limitées en taille et en extension — les seules qui soient accessibles à un tel traitement locorégional curateur — est une clé essentielle des possibilités de guérison. Le dépistage, quand il est justifié, et la détection précoce revêtent donc à ce titre une importance capitale. C'est un domaine dans lequel l'imagerie a progressé de façon spectaculaire, gagnant en sensibilité et en simplicité de mise en œuvre, et permettant de mettre en évidence des lésions de plus en plus petites et précoces, accessibles à un traitement local curateur éventuellement guidé par imagerie. L'amélioration de la sensibilité de nos modalités d'imagerie a été considérable et peu de progrès sont encore attendus à court terme dans ce domaine. L'amélioration de la spécificité, serpent de mer de l'imagerie depuis des lustres, est donc bien devenue l'enjeu incontournable des prochaines années, d'autant que la découverte de petites lésions douteuses va sans doute se multiplier. Comment distinguer une lésion précancéreuse d'un cancer avéré ? Comment évaluer la réponse au traitement plus précocement et de façon plus pertinente que par des mesures de taille ? Comment s'adapter aux enjeux des nouvelles thérapies ciblées ? Autant de questions qui nécessitent absolument de progresser en spécificité. L'imagerie fonctionnelle de la microcirculation, des propriétés élastiques des tissus, de la diffusion intratissulaire de l'eau sont des domaines en plein essor, de surcroît assez facilement accessibles sur les modalités de base. Les développements de la TEP et de ses traceurs, celui des produits de contraste spécifiques pour l'imagerie IRM, l'accès à la spectroscopie IRM in vivo qui se simplifie grâce aux très hauts champs, les prémices d'une imagerie métabolique IRM utilisant des marqueurs hyperpolarisés, l'arrivée de l'imagerie optique dans la cour de l'imagerie clinique sont autant d'exemples qui démontrent que l'imagerie cancérologique de demain sera résolument biologique.