Biologika bei Steroidversagen

Mukosaheilung als Therapieziel

Mukosaheilung ist heute das Therapieziel bei Morbus Crohn. Bei Steroidversagen lohnt sich daher die frühe Anwendung von Biologika.

Ist bei Patienten mit Morbus Crohn die Schleimhaut dauerhaft entzündet, muss damit gerechnet werden, dass sich langfristig Vernarbungen, Strikturen und Stenosen entwickeln. Ein wichtiges Ziel der Therapie ist die steroidfreie Remission, außerdem strebt man inzwischen eine vollständige Mukosaheilung an. Die Patienten profitieren deutlich davon: Es ist nachgewiesen, dass sie bei vollständiger Abheilung der Mukosa länger in steroidfreier Remission bleiben und seltener operiert werden müssen.

Abszess und Stenose ausschließen

Bis zu 20% der Patienten mit Morbus Crohn erreichen selbst durch eine Therapie mit hoch dosierten Steroiden (mindestens 75 mg/kg Körpergewicht Prednisolonäquivalent/Tag) über vier Wochen keine Remission, sie sind steroidrefraktär. In diesen Fällen ist es wichtig, noch vor der Änderung oder Eskalation der medikamentösen Therapie Komplikationen wie Abszesse oder Stenosen und gastrointestinale Infektionen auszuschließen. Darauf weist Dr. Michael Manz vom Claraspital in Basel hin [1]. Hierfür seien Stuhluntersuchungen und bildgebende Verfahren erforderlich.

Auf jeden Fall ist bei diesen Patienten eine immunsuppressive Therapie indiziert. Diesbezüglich hat sich in den vergangenen Jahren einiges geändert. Nach

wie vor kann die Behandlung mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Methotrexat erfolgen. Aktuelle Studien zufolge lohnt es sich aber, frühzeitig einen Tumornekrose (TNF)-alpha-Blocker einzusetzen, denn damit ist bei einem Großteil der Patienten ein Abheilen endoskopisch nachweisbarer Läsionen zu erreichen.

Die Europäische Crohn's und Colitis Organisation (ECCO) weist in ihrer Leitlinie aus dem Jahr 2010 darauf hin, dass TNF-alpha-Blocker in einem frühen Krankheitsstadium wirksamer sind als bei späterem Einsatz. Die Therapie kann mit oder ohne die zusätzliche Gabe von Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Methotrexat erfolgen. Die für diese Indikation in Deutschland zugelassenen TNF-alpha-Blocker Adalimumab und Infliximab haben ein vergleichbares Wirkungsprofil und ähnliche Nebenwirkungen.

Mit TNF-alpha-Blockade zum Erfolg

Die Wirksamkeit von Infliximab bestätigt zum Beispiel die SONIC-Studie an 508 Patienten mit moderatem bis schwerem Morbus Crohn. Nach 26 Wochen Behandlung hatten unter der Monotherapie mit Azathioprin 30%, unter der Monotherapie mit Infliximab 44% und unter der Kombination Infliximab plus Azathioprin 57% eine steroidfreie Remission erreicht, wobei die Unterschiede zwischen den Studiengruppen signifikant waren.

Bei der Mukosaheilung als objektivem Parameter des Therapieerfolgs zeigte sich ein ähnliches Ergebnis: Die Schleimhautveränderungen waren bei 16,5% der Patienten unter Azathioprin, bei 30% unter Infliximab und bei 44% der Patienten unter der Kombination abgeheilt.

Auch mit Adalimumab ist Mukosaheilung möglich

Und die EXTEND-Studie zeigte, dass auch mit Adalimumab eine Mukosaheilung möglich ist.

Nach zwölf Wochen erreichten dieses Therapieziel 27 % der Patienten unter Adalimumab im Vergleich zu 13% unter Placebo, nach 52 Wochen war dies unter Adalimumab bei 24% der Fall, in der Placebogruppe dagegen bei keinem Patienten.

Die Remissionsraten, basierend auf dem Crohn's Disease Endoscopic Index of Severity, betrugen nach zwölf Wochen 52 bzw. 28% und nach 52 Wochen 28 bzw. 3% (jeweils Adalimumab versus Placebo).

(Judith Neumaier)

[1] Gastroenterologe 2013, 8: 205-210;
Ärzte Zeitung, 18.07.2013

Stammzellentransplantation

Kommt Hilfe aus dem Knochenmark?

Eine Transplantation hämatopoetischer Stammzellen ist möglicherweise eine effektive Option zur Crohn-Therapie. Darauf deuten die 1-Jahres-Ergebnisse der ASTIC-Studie hin, die Dr. Christopher Hawkey aus Nottingham, Großbritannien, bei der Digestive Disease Week in Orlando, USA, vorstellte. Eine vollständige Mukosaheilung erreichten 40% der 45 Patienten mit moderatem bis schwerem M. Crohn, die Stammzellen bekamen, aber nur 15% der Patienten in der Kontrollgruppe. Ein Jahr nach Stammzelltransplantation hatten zwei Drittel der Patienten Immunsuppressiva und Steroide abgesetzt.

(jn)

Bessere Prognose

Morbus-Crohn-Patienten profitieren deutlich von einer vollständigen Heilung der Mukosa:

- Sie bleiben länger in steroidfreier Remission.
- Sie müssen seltener operiert werden.