Erhöhtes Infektionsrisiko

Impfen trotz oder gerade wegen Rheuma?

Sowohl die Krankheit, als auch die Therapie erhöhen bei RA das Infektionsrisiko. Schutzimpfungen sind daher wichtig.

Das Infektionsrisiko ist unter immunsuppressiver Therapie generell erhöht. Werden Risikofaktoren beachtet und prophylaktische Maßnahmen ausgeschöpft, sei es aber überschaubar, erläuterte Prof. Dr. Klaus Krüger beim Praxis-Update in Wiesbaden. Das Risiko für schwere Infektionen sei vor allem in der ersten Therapiephase erhöht. Das liege primär an der hohen Krankheitsaktivität und am hohen Glukokortikoidbedarf (GC)

Hohe Impfdefizite im Land

Faktoren, die das Risiko erhöhen, sind z. B. ein höheres Lebensalter, renale und pulmonale Komorbiditäten sowie eine GC-Dauertherapie [1]. Ein hohes Risiko bestehe dann, wenn sich mehrere Faktoren auf einen Patienten vereinigen, so der Münchner Rheumatologe. Daher sei es wichtig:

- Risikopatienten gut zu überwachen
- die GC-Therapie zu reduzieren
- die RA optimal einzustellen
- Therapiepause bei akutem Infekt
- vor der Therapie ein Tbc- und Hep-Screening vorzunehmenden

- Impfstatus vor der Therapie zu aktualisieren, bzw.
- Schutzimpfungen auch während der Therapie vorzunehmen.

Der Impfstatus von RA-Patienten sei in Deutschland insgesamt enorm defizitär, so Krüger. In der multinationalen COMORA-Studie waren nur 19% der deutschen RA-Patienten gegen Pneumokokken geimpft, und 42% gegen Influenza [2].

Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie empfiehlt, Auffrischimpfungen für Tetanus und Diphtherie sowie Impfungen gegen Pneumokokken, Meningokokken und Influenza, vorzugsweise mit Totimpfstoffen. Lebendimpfstoffe, u.a. MMR, Varizellen oder Gelbfieber, gelten als ausreichend sicher bei Patienten mit einer Steroiddosis <20 mg Prednison-äquivalent/Tag, topischen Steroiden, Antimalariamitteln und Sulfasalazin. Unter deutlicher Immunsuppression sind sie kontraindiziert. Unter bestimmten Bedingungen können Lebendimpfstoffe dennoch verabreicht werden, Nutzen und Risiken gilt es dabei abzuwägen. Impfungen bei aktiver Grunderkrankung sollten, vermieden werden. (otc)

[1] Ann Rheum Dis 2014; 73: 1673-76;

[2] Vaccine 2015; 33: 1446-52

ÜBRIGENS

... kann eine begleitende Physiotherapie helfen, bei Patienten mit axialer Spondylarthritis den Verbrauch an Medikamenten zu senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Pilotstudie mit 20 Patienten. Die Teilnehmer bekamen dreimal wöchentlich für jeweils 30 Minuten Physiotherapie.

J Rheumatol 2014; 41/9: 1897-1898

... bieten Biomarker Anhaltspunkte für das Absetzen von Mtx. Dabei handelt es sich um Calprotectin (MRP/14), Calgranulin C (S100A12) sowie hoch-sensitives C-reaktives Protein (hsCRP). Sind die Werte für diese Biomarker erhöht, sollte besser auf ein Absetzen von Mtx verzichtet werden, da das Risiko für einen Rückfall stark erhöht ist, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Rheuma-Liga.

European Heart Journal 2015, online 28. April

Punkte sammeln mit der Sommerakademie!

Zum Thema „Rheuma“ finden Sie unter www.springermedizin.de/sommerakademie aktuell den Kurs

„Rheumatoide Arthritis: Schauen Sie Ihren Patienten auf die Finger“

Mit e.Med teilnehmen

Mit e.Med haben Sie nicht nur Zugriff auf die aktuelle Sommerakademie, Sie können das komplette Angebot von Springer Medizin nutzen – zusätzlich erhalten Sie eine gedruckte Fachzeitschrift Ihrer Wahl. Mit rund 1600 Fortbildungskursen, davon über 500 CME-zertifiziert, ist die e.Akademie Deutschlands erste Adresse für Online-CME-Fortbildung.

Nutzen Sie die Sommerzeit, um reichlich CME-Punkte zu sammeln!

e.Med 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen: www.springermedizin.de/eMed

Unser Kundenservice steht Ihnen wochentags (10–17 Uhr) kostenlos zur Verfügung: Tel. 0800 77 80 777 kundenservice@springermedizin.de

► schaltung von B-Zellen (Rituximab, Mabthera®) und die Blockade der T-Zell-Aktivierung durch Antigen-präsentierende Zellen (Abatacept, Orencia®). Bestehen keine Kontraindikationen, werden laut EULAR-Empfehlungen Biologika mit Mtx kombiniert.

Pluspunkte der Biologika sind der schnelle Wirkeintritt sowie die gute Wirksamkeit. In zahlreichen Studien wurde deutlich, dass nicht nur radiologisch sichtbare Schäden verhindert, sondern auch das kardiovaskuläre Risiko und die krankheitsassoziierte Mortalität reduziert werden. Zurückzuführen ist dies auf die starke antiinflammatorische Wirkung.

Gelingt es nicht, die Krankheit unter Kontrolle zu bekommen, ist die RA-assoziierte Mortalität erheblich: So zeigt eine Untersuchung aus dem deutschen RAB-BIT-Register (RA observation of biologic therapy), dass Patienten mit hoher Krankheitsaktivität (DAS 28 >5,1) mit einem Verlust von 10 Lebensjahren zu rechnen haben [4]. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass durch den Einsatz von Biologika im Vergleich zu csDMARD die Mortalität um rund 40–50% reduziert werden kann. (otc)

[1] Z Rheumatol 2012; 71: 592-603, [2] Ann Rheum Dis 2014; 73: 492-509, [3] BMJ open 2014; 4: e004259,

[4] Ann Rheum Dis 2015; 74: 415-421