Multiple Fisteln, Fremdkörper & bakterielle Superinfektion

Selbstinjektion mit Vaseline zur Penisvergrößerung

Immer häufiger werden schwere Komplikationen nach fremd- oder selbst durchgeführter Penisaugmentationen beobachtet. Wir berichten über einen 43-jährigen Patienten, der sich nach mehrfachen Vaselininjektionen am Penis mit multiplen Parafinomen, Fisteln und bakterieller Superinfektion vorstellte.

Ein 43-jähriger Patient südosteuropäischer Herkunft stellte sich im Sana Klinikum Offenbach in der urologischen Sprechstunde mit multiplen Fistelöffnungen, Schmerzen und bakterieller Superinfektion v. a. am Penis vor. Zudem klagte der Patient über eine schmerzbedingte Impotenz, ausgeprägte Weichteilschwellung und Penisverformung, berichten Dr. Andreas Gröger und Kollegen in „Der Urologe“.

Bei der Anamnese stellte sich heraus, dass der Patient drei Monate zuvor mehrfache Vaselininjektionen durch einen Bekannten durchgeführt hatte. Bei der klinischen Untersuchung zeigte sich eine zirkuläre derbe Verdickung mit mehreren Hautperforationen und einem ca. 5 mm durchmessenden Hautdefekt.

Entzündete Penishaut bis hinunter zur Buck-Faszie

Nach stationärer Aufnahme zeigte sich der gesamte Schaftbereich des Penis und die Penisschwanzwurzel mit multiplen Fisteln sowie Fremdkörpergranulomen infektiös durchsetzt. Der Weichteilmantel oberhalb der Buck-Faszie musste radikal exzidiert werden. Zur Wundkonditionierung wurden die offenen Areale komplett mit alloplastischem Material (Syspur-Derm), getränkt in aseptischer Lösung (Furacine-Ringer-Lösung), gedeckt. In der histologischen Untersuchung zeigten sich ausgeprägte Entzündungsreaktionen, Fistelungen sowie multiple Paraffinome.

Bei der zweiten operativen Phase führten die Chirurgen die Fremdkörperexzision und Hämatomentlastung am Skrotum durch. Intraoperative Abstriche ergaben den Nachweis von *Pseudomonas aeruginosa* und *Enterococcus faecalis*. Die lokale Wundsituation besserte sich sukzessive unter der chirurgischen Wundtherapie und systemischen resistenzgerechten Antibiotikatherapie mit Ciprofloxacin.

Zwei Vollhauttransplantate zur Peniswiederherstellung

Bei allseits vitalem Wundgrund führten die Offenbacher Ärzte zunächst die komplette Penisdeckung mit zwei 5 × 10 cm großen Vollhauttransplantaten aus den beiden Leisten durch. Zusätzlich wurde bis Abschluss der Wundheilung zur Erektionsprophylaxe Diazepam eingesetzt. Darunter zeigten sich zunehmend reizlose Wundverhältnisse und der Patient konnte nach eingeeilter Vollhaut entlassen werden, berichtet Gröger.

Der Patient stellte sich 6 Monate nach Entlassung mit vollständig abgeheilten Wundverhältnissen und mit vollständiger Wiederherstellung der Sexualfunktion wieder vor. Mit dem ästhetischen Ergebnis war der Patient zufrieden.

Präoperativer Befund nach mehrfacher Vaselininjektion.

Neben den gängigen Methoden aus der plastischen Chirurgie sind immer wieder von Augmentationsversuchen mit semi-flüssigen Substanzen, u. a. mit Vaseline, Mineralöl oder Silikon, berichtet worden. Ohne Kenntnis der potenziellen Gefahren und ohne Beachtung anatomischer Strukturen, Sterilität und Hygiene wird der Eingriff vorgenommen. Da der menschliche Körper keine Enzyme zum Abbau der Substanzen besitzt, verbleiben sie unregelmäßig deponiert in den eingespritzten Zonen. Beschwerden können entweder sofort oder verzögert, manchmal nach mehreren Jahren auftreten. (Gröger/red)

Gröger A et al, Urologe 2015, 54:397–399; DOI 10.1007/s00120-014-3651-9

Ab 55 Wochenstunden wird's gefährlich

Überstunden erhöhen das Schlaganfallrisiko

Berufstätige, die mit ihrer Wochenarbeitszeit über 55 Stunden kommen, haben offenbar ein signifikant erhöhtes Schlaganfallrisiko.

Mika Kivimäki und Kollegen vom University College London widmeten sich in der in „Lancet“ publizierten Metaanalyse dem Zusammenhang von Mehrarbeit und vaskulären Erkrankungen. Überstunden waren ab 55 Arbeitsstunden definiert. Binnen 8,5 Jahren Beobachtung entwickelten 4768 Teilnehmer von insgesamt 603.838 Männern und Frauen ein Koronarereig-

nis. Überstunden erhöhten hier nur leicht das Risiko (13%).

33% mehr Schlaganfälle

Anders sah das beim Schlaganfall aus: Hier waren 55 Stunden und mehr mit einer signifikanten Risikoerhöhung um relative 33% assoziiert. In die Analyse waren die Daten von 528.908 Arbeitnehmern eingeflossen, die über 7,2 Jahre nachbeobachtet worden waren. In dieser Zeit waren 1722 Ereignisse aufgetreten. (ob)

Kivimäki M et al. Lancet, online 20. August 2015