Blickdiagnose interaktiv auf www.springermedizin.de

Wuchs da eine Erdnuss in der Backe?

Ein 61-jähriger Patient ohne weitere Allgemeinerkrankungen stellt sich mit einer erdnussgroßen, nicht schmerzhaften Raumforderung in der linken Wange vor. Der Patient berichtete über einen geringen Größenzuwachs in den letzten Jahren. Beschwerden hat er keine. In der Anamnese fehlen Hinweise auf eine B-Symptomatik. **Worum handelt es sich?**

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

- Speichelstein
- Atherom
- Nasennebenhöhlenzyste
- solitärer fibröser Tumor

Gehen Sie auf www.springermedizin.de/5804270 und klicken Sie auf dem Beitrag Ihre Lösung an. Dort erfahren Sie sofort, ob Sie richtig liegen – nebst interessanten Infos zu diesem Fall.

Auflösung „Schwanger und auf einmal juckt der Bauch“

Es handelt sich um ein Pemphigoid gestationis. Das Pemphigoid gestationis (früher Herpes gestationis) ist eine polymorphe, stark pruriginöse, blasenbildende seltene (Inzidenz 1:50.000 Schwangerschaften) Autoimmundermatose der Spätschwangerschaft und der Postpartalperiode, die pathophysiologisch einem bullösen Pemphigoid gleicht. Häufig besteht starker Pruritus Tage bis Wochen vor Auftreten des polymorphen Exanthems. Die Hautveränderungen beginnen meist periumbilikal, eine Ausbreitung auf das gesamte Integument ist möglich, das Gesicht bleibt oft ausgespart. Leiteffloreszenzen sind elevierte Erytheme und Urtikae. Vesikel und Blasen entstehen erst später. Häufig verläuft das Pemphigoid gestationis auch ohne Blasenbildung. Der Verlauf ist selbstlimitierend, die Abheilung erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Schwangerschaft. Es besteht ein hohes Rezidivrisiko in nachfolgenden Schwangerschaften bei gleichem Vater mit früherem Beginn und schwererem Verlauf. Therapieziel ist die Kontrolle des Juckreizes und die Unterdrückung der Blasenbildung. Orale Antihistaminika (H1-Rezeptorenblocker) und topische Glukokortikoide sind meist ausreichend.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

- Die Kooperation der Angehörigen kann eingeschränkt sein, sei es durch Ängste, den Wunsch nach Verdrängung, Konflikte mit dem Patienten oder Zeitmangel.
- Bei noch einwilligungsfähigen Patienten drängt die Zeit, da der Verlauf der Demenz im Einzelfall nicht ohne weiteres vorausgesagt werden kann.

In der Praxis sollte Patienten mit Demenzdiagnose die Beratung zum Thema Patientenverfügung beziehungsweise Anpassen einer vorhandenen Patientenverfügung angeboten werden. Das Vorgehen sollte dabei individuell angepasst werden (freier Text versus Nutzen eines Formulars, Umfang, Einbeziehung Angehöriger etc.).

Wegen der bei Diagnosestellung mehrere Jahre umfassenden Lebenserwartung sollten auch nicht demenzspezifischen Themen Berücksichtigung finden, wie sie in differenzierten Formularen

dargestellt werden. Das Einsetzen eines Bevollmächtigten für Gesundheitsfragen wird oft sinnvoll sein. Der beratende Arzt sollte die Einwilligungsfähigkeit des Patienten und die stattgehabte Beratung in der Patientenverfügung dokumentieren, um ihr mehr Gewicht zu verleihen.

Die Patientenverfügung sollte im weiteren Verlauf bei Änderungen von Lebensumständen, Gesundheitszustand oder Einstellungen angepasst werden. Hierzu ist eine kontinuierliche Begleitung des Patienten und seiner Angehörigen erforderlich.

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

Eine Zusammenarbeit mit allen beteiligten Therapeuten, Pflegeheimen, Hausärzten, Palliativteams und den jeweiligen Bevollmächtigten ist angebracht. Die Patientenverfügung sollte in Kopie im Haushalt des Patienten selbst und bei seinem Hausarzt, in der Pflegeeinrichtung

und im Original dem Bevollmächtigten vorliegen.

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind bei guter Kommunikation durch die Erstellung einer individuellen Patientenverfügung erleichtert und haben weniger Zukunftsängste. Sie haben im Rahmen des Formulierungs- und Anpassungsprozesses die Möglichkeit, sich mit der Zukunft auseinander zu setzen, Fragen zu stellen und Wünsche zu äußern. Angehörige können sich auf den zu erwartenden Verlauf einstellen, einer Überforderung kann ein Stück weit vorgebeugt werden und die Patienten im Spätstadium erleben eine bessere palliative Versorgung. Der Tod des Patienten wird trotz der schweren Erkrankung häufiger als ein „guter Tod“ empfunden, wenn auf die skizzierte Weise Vorsorge betrieben worden ist.

Literaturliste beim Verlag;
Der Neurologe und Psychiater 2015; 16 (5): 31