Auch für Nicht-Behandelte

Gefährliche Folgen von Antibiotika im Pflegeheim

Wie häufig Pflegeheimbewohner Antibiotika erhalten, hängt offenbar stark von der jeweiligen Einrichtung ab; das legt eine Studie aus Kanada nahe. In Heimen mit häufigem Einsatz stieg die Gefahr antibiotikaassoziierter Schäden deutlich – und zwar nicht nur bei den Behandelten.

Eine erstaunliche Variabilität in der Verordnung von Antibiotika an Pflegeheimbewohner zeigt sich in einer kanadischen Studie: Wie die Forscher um Dr. Nick Daneman von der Universität Toronto berichten, schwankte der Antibiotikaeinsatz zwischen den verschiedenen Einrichtungen um das knapp Zehnfache: So lag der Anteil der Antibiotikage in den Einrichtungen mit niedrigstem Verbrauch bei 20,4, in denen mit höchstem Verbrauch bei 192,9 Tagen, jeweils bezogen auf 1000 Bewohnertage.

An der offenen Longitudinalstudie waren 110.656 Bewohner aus insgesamt 607 Einrichtungen beteiligt; das Durchschnittsalter lag bei 85 Jahren. Insgesamt wurden an 2.783.000 von 50.953.000 Bewohnertagen Antibiotika verabreicht; dies entspricht einer Rate von 55 Antibiotikage pro 1000 Bewohnertage.

Je großzügiger die Einrichtungen beim Verteilen von Antibiotika waren, desto mehr Schaden richteten diese bei den Patienten an: Die Wahrscheinlichkeit irgendeines unerwünschten Ereignisses im

Zusammenhang mit Antibiotika war in den Heimen mit hohem Verbrauch um 24% höher als bei solchen mit niedrigem Verbrauch. In Ersteren traten antibiotikaassoziierte Durchfälle oder Gastroenteritiden bei 11,6% der Bewohner auf, Infektionen mit resistenten Erregern bei 1,3%, Infektionen mit *Clostridium difficile* bei 0,9% und Antibiotikaallergien bei 0,1%. Insgesamt lag der Anteil der Schädwirkungen durch Antibiotika bei 13,3% in Heimen mit hohem Verbrauch gegenüber 11,4% in solchen mit niedrigem Verbrauch.

Penicillin am häufigsten verabreicht

Faktoren, die nach Angaben der Forscher die Vulnerabilität für solche Schäden erhöhten, waren u. a. fortgeschrittenes Alter, Diabetes mellitus, eine periphere Gefäßerkrankung sowie Leber- und Nierenerkrankungen.

Penicillin war in allen Einrichtungen das am häufigsten verabreichte Antibiotikum, mit einem Anteil an sämtlichen Antibiotikaverschreibungen zwischen 32,6% und 33,7%, gefolgt von Fluorchinolonen der zweiten Generation (27,1% bis 31,7%). Einen geringeren Anteil machten Cephalosporine, Nitrofurantoin und Makrolide aus (zwischen 4% und 9%).

Folgen auch für Nicht-Behandelte

Frappierend und auch für Pflegebedürftige in Deutschland relevant ist vor allem ein Ergebnis: In den Heimen, die Antibiotika am großzügigsten einsetzten, zeigten nicht nur Antibiotikanutzer deutlich höhere Raten unerwünschter Ereignisse. Die mit der Therapie assoziierten Gesundheitsschäden waren in solchen Einrichtungen auch bei den Bewohnern signifikant erhöht, die gar keine Antibiotika erhalten hatten.

Die Forscher erklären dies mit einem gesteigerten Selektionsdruck auf das lokale Mikrobiom: Bei hohem Antibiotikaeinsatz steigt in der ganzen Einrichtung die Rate resistenter Keime; vor allem *C. difficile* kann sich stark vermehren. Da des Öfteren Patienten aus Pflegeheimen in andere Einrichtungen verlegt werden, besteht nach Daneman und Kollegen zudem die Gefahr, dass sich resistente Erreger über die Mauern des Heims hinweg ausbreiten.

Die Wissenschaftler um Daneman appellieren an alle Pflegeeinrichtungen, die Prinzipien der Antibiotic Stewardship, also des sorgsam Umgangs mit Antibiotika, zu befolgen. Die Kernpunkte sind u. a. auf der Seite der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) einzusehen. Eine umfassende Anleitung zum rationalen Einsatz von Antibiotika gibt auch eine deutsche S3-Leitlinie.

In Deutschland erfolgt die Mehrzahl der Antibiotikaverschreibungen im ambulanten Bereich (85%). Hier war, wie aus einer Studie des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (ZI) hervorgeht, in den letzten Jahren speziell bei den über 70-Jährigen erfreulicherweise ein Rückgang zu verzeichnen.

(Elke Oberhofer)

Daneman N et al. JAMA Intern Med 2015 (online first)