Lungenschaden durch E-Zigarette

Nicht immer sind es Nikotin und Teer, die der Lunge zusetzen: Manche Menschen reagieren mit einer exogen allergischen Alveolitis auf die Zusatzstoffe, und davon gibt es reichlich in E-Zigaretten. Bei ca. 70% der süßlich aromatisierten Liquids wird der Zusatzstoff Diacetyl verwendet. Die Substanz ist in der EU als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Sie steckt auch in Ölen und Fetten, Backwaren oder Fertiggerichten, schmeckt nach Butter und wird meist als „Butteraroma“ deklariert. Die Chemikalie hat bereits als mutmaßlicher Auslöser der „Popcorn-Lunge“, eine Bronchiolitis obliterans, für Aufsehen gesorgt, ausgelöst u. a. durch Mikrowellen-Popcorn.

Atkins G et al. Chest 2015; 148 (4 Meeting Abstracts): 83A

Melanomrisiko? Bitte den Arm freimachen!

Die Zahl der Nävi am rechten Arm korreliert offenbar am besten mit der Zahl am ganzen Körper – Mehrere Studien haben die Assoziation zwischen der Zahl der gewöhnlichen melanozytären Nävi und dem Melanomrisiko belegt: Je höher die Zahl, umso größer das Risiko, auch wenn nur 20 – 40% der Melanome aus Nävi hervorgehen. Dadurch ließen sich möglicherweise mehr Patienten als bisher mit einem erhöhten Risiko bereits in der Hausarztpraxis identifizieren.

Ribero S et al. Br J Dermatol 2015 (online first)

springermedizin.de
auf Twitter

Auch im Herbst heißt es

„Lauschen“ Sie unserem
Zwitschern und werden Sie zum
„Follower“

► twitter.com/springermedizin

Postprandiale Hyperglykämie bei Typ-2-Diabetes

Verzicht aufs Frühstück verdirbt den ganzen Tag

Bei Typ-2-Diabetikern führt der Verzicht auf ein Frühstück nach dem Mittag- und Abendessen zu einer postprandialen Hyperglykämie.

Den Zusammenhang zwischen Frühstücksverzicht und erhöhten Glukosewerten nach den Hauptmahlzeiten beobachteten Diabetesforscher um Dr. Daniela Jakubowicz in einer Studie mit 22 Typ-2-Diabetikern. Bei zehn Teilnehmern wurde der Hyperglykämie ausschließlich mithilfe der Ernährung gegengesteuert, zwölf Patienten erhielten Metformin. An den Testtagen mit bzw. ohne Frühstück wurden die postprandialen Werte von Glukose, Insulin, C-Peptid, freien Fettsäuren, Glukagon und GLP im Plasma gemessen. Die Proben wurden per Dauerkatheter kurz vor den

festgelegten Essenszeiten sowie 15, 30, 60, 90, 120 und 180 Min. danach genommen.

Insulinspitzen mit 30 Min Verzug

Im Vergleich zur Situation mit Frühstück waren die Glukosewerte ohne Frühstück signifikant erhöht, nach dem Mittagessen um 36,8% und 26,6% nach dem Abendessen. Ebenfalls erhöht waren die freien Fettsäuren und Glukagon. Signifikant niedriger waren dagegen die Werte für Insulin und GLP. Die Insulinspitzenwerte traten nach dem Mittag- und Abendessen um 30 Min später auf, wenn auf das Frühstück verzichtet wurde. Eine mögliche Erklärung ist die Störung des zirkadianen Rhythmus. (rb)

Jakubowicz D et al. Diabetes Care 2015;38:1820–1826

Überlebenschance bei GI-Tumoren verdoppelt

Wundermittel Acetylsalicylsäure

Die Einnahme von Acetylsalicylsäure (ASS) nach der Diagnose eines gastrointestinalen (GI-)Tumors verbessert das Überleben.

Dieses Ergebnis einer Analyse von fast 14.000 Patientendaten hat Martine Frouws, Leiden, Niederlande, auf dem diesjährigen Europäischen Krebskongress (ECC) vorgestellt. Alle Patienten hatten einen GI-Tumor: 42,8% im Dickdarm, 25,4% im Enddarm und 10,2% in der Speiseröhre. 30,5% der Patienten hatten bereits vor der Diagnosestellung ASS, 61,1% hatten keine ASS eingenommen, 8,3% starteten mit der Einnahme nach der Diagnosestellung. Die mediane Beobachtungszeit lag bei 48,6 Monaten.

28% der Patienten überlebten mindestens fünf Jahre. Patienten, die ASS einnah-

men, hatten eine doppelt so hohe Überlebenschance im Vergleich zu denen ohne ASS. Dabei wurde laut Frouws jeder Patient einzeln analysiert. Im nächsten Schritt soll nun das Tumorgewebe eines jeden untersucht werden, um den positiven Effekt von ASS eventuell einem bestimmten Tumorgewebe zuordnen zu können.

ASS verhindert das Versteckspiel

Man geht davon aus, dass die positive Wirkung auf dem Antiplättchen-Effekt beruht. Es wird vermutet, dass zirkulierende Tumorzellen sich durch sie umgebende Blutplättchen vor der Immunabwehr verstecken. ASS verinnert damit die Chance, dass sich die Tumorzellen in Thrombozytenkonglomeraten verstecken können. (HO)

18th ECCO/40th ESMO (ECC 2015), 25.–29.09.2015, Wien