Éditorial

Editorial

J. Le Gall

© Springer-Verlag France 2012

Dans le cadre du 10^e Congrès de la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD), la commission professionnelle infirmière présentait le « cours supérieur soins infirmiers » sur le thème « céphalées, douleurs orofaciales : quelles douleurs, quels soins ? ». Le but était d'expliquer les spécificités des douleurs liées aux pathologies concernées, de connaître les traitements les plus appropriés et de montrer le rôle infirmier dans la prise en charge de ces patients, en particulier celui des infirmiers ressource douleur (IRD). Les infirmières intervenant dans ce cours présentaient aussi des expériences innovantes d'équipe soignante dans la prise en charge non médicamenteuse des patients qu'elles soignent dans leurs différents lieux d'exercice.

Les migraines, pathologie fréquemment retrouvée chez l'adulte, touchent aussi les enfants et les adolescents et sont pour eux un véritable handicap, entraînant un absentéisme scolaire et une réduction des activités extrascolaires, avec un impact sur la qualité de vie de la famille. Les traitements médicamenteux ont fait l'objet de recommandations de l'ANAES, un suivi et une approche globale incluant les méthodes non médicamenteuses pourraient améliorer la prise en charge de ces patients.

La névralgie du trijumeau est une cause fréquente de céphalée aiguë récidivante, concernant particulièrement les femmes à partir de 50 ans. Elle entraîne des douleurs majeures qui peuvent être très handicapantes et sources d'une détresse psychologique majeure dans les cas sévères. En cas d'échec ou d'intolérance du traitement médicamenteux, le traitement chirurgical est proposé.

Les douleurs de la sphère orofaciale sont multiples ; l'article proposé se limite essentiellement aux pathologies les plus fréquentes rencontrées, comme les affections rhinosinusiennes, pharyngolaryngées, l'otite moyenne de l'enfant ainsi que la pathologie cancéreuse ORL. Si les douleurs des premières pathologies citées se solutionnent le plus sou-

vent par un traitement étiologique, dans la pathologie cancéreuse de la sphère orofaciale il est important de ne pas négliger les douleurs secondaires provoquées par la tumeur, la chirurgie et/ou autres traitements de la maladie, ainsi que la souffrance générée par le changement d'image qui affecte les relations familiales et sociales, et la qualité de vie des patients.

Le troisième Plan douleur (2006–2010) avait inscrit dans sa priorité 3 : « *Améliorer les modalités de traitement médicamenteux et d'utilisation des méthodes non pharmacologiques pour une prise en charge de qualité* ». Le rapport d'évaluation du plan a constaté que le développement de ces méthodes restait encore trop limité et se heurtait à différents obstacles, malgré l'intérêt que leur portent les patients. Quel intérêt les professionnels de santé accordent-ils à ces méthodes ? Quelle place leur réservent-ils dans leur pratique ? Quelles sont les possibilités des patients d'accéder à ces méthodes ? Des questions que tous les professionnels de santé peuvent se poser. Il existe des formations qualifiantes qui permettent l'utilisation de ces méthodes par des professionnels de santé, la difficulté pour les patients étant de connaître ces professionnels et de pouvoir obtenir une prise en charge financière. Des perspectives intéressantes s'ouvrent aux infirmiers spécialisés dans la prévention et le traitement de la douleur (IRD) qui pourraient être impliqués dans des travaux de recherche et d'évaluation de l'efficacité de ces techniques.

Certains établissements proposent ce type de solution non médicamenteuse à leurs patients, et une expérience d'éducation thérapeutique est décrite par l'IRD qui l'a mise en œuvre : la relaxation pour des patientes migraineuses. Si l'expérience reste modeste pour l'instant, les évaluations des patientes à terme permettent de souligner des améliorations de leur qualité de vie au quotidien.

À la consultation douleur, lorsque l'infirmière accueille le patient, elle est, face-à-face, confrontée à la plainte du patient et de son entourage. Au cours de l'entretien, où elle laisse le patient s'exprimer, puis par l'interrogatoire ciblé, elle va pouvoir identifier la douleur, l'impact de celle-ci sur sa vie et celle de son entourage, et enfin reconstituer l'historique de

J. Le Gall (✉)

Commission professionnelle infirmière de la SFETD, hôpital Pasteur, département Douleur, 30 avenue de la voie romaine, F-06002 Nice
e-mail : Jocelyne.legall@orange.fr

son traitement afin de participer à l'évaluation et l'orientation du patient dans le cadre de la pluridisciplinarité. Le rôle de l'IRD, tel que le décrit une infirmière exerçant en Belgique, a toute sa place en consultation douleur, de l'arrivée du patient au suivi, et jusque dans l'éducation thérapeutique au cours de sa prise en charge.

Soigner et accompagner, innover dans la recherche d'une meilleure qualité de vie pour des patients atteints de lésions cutanées, c'est ce que présente dans son article l'infirmière ressource douleur (IRD) de cette équipe qui s'est spécialisée dans le maquillage correcteur. Redonner aux autres et à soi-même une image qui permette de vivre mieux, c'est ce qui motive ces patients, parfois peu habitués à manipuler les produits de « maquillage », qui devient alors un soin à part entière.

Le deuxième Plan douleur (2002–2005) comportait dans ses priorités : développer le rôle infirmier dans la prise en charge de la douleur provoquée par les soins. Des postes « d'infirmiers douleur » avaient ainsi été créés. La commission professionnelle infirmière de la SFETD a mené en 2005 une enquête auprès de ces infirmiers afin de définir leur profil et leurs différentes activités. Les résultats de cette enquête publiés lors du Congrès douleur 2006 ont permis d'écrire le référentiel d'activités des IRD, qui montre le développement de nouvelles compétences, tant en consultation douleur qu'en mission transversale dans les établissements, auprès des patients comme auprès des soignants. Après le troisième plan et dans l'attente d'un éventuel quatrième Plan douleur, des questions se posent pour les IRD quant à la pérennité de ces postes spécifiques qui ont pourtant fait la preuve de leur efficacité dans tous les établissements où ils sont instaurés. Dans le cadre de la loi HPST de 2009, un cadre établit les

partages de savoir-faire entre professionnels de santé, la coopération se faisant essentiellement à partir de l'expérience et de la pratique. Les IRD peuvent-ils faire valoir leurs compétences en tant que « pratiques avancées » ? Cela entraînera-t-il un nouveau métier, une nouvelle identité professionnelle ?

Voilà des pistes de réflexion pour la commission professionnelle infirmière de la SFETD, afin de continuer à promouvoir le travail des IRD, au sein de la société savante et dans toutes les instances où ils peuvent apporter l'éclairage particulier de leurs savoir-faire et compétences. Le développement des méthodes non médicamenteuses ouvre un champ intéressant pour les professionnels non médicaux, en particulier les IRD, qui, suite à des formations adaptées, participent activement à la mise en œuvre de ces méthodes dans les équipes pluridisciplinaires. Des projets de recherche en soins infirmiers ont été promus par le Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) et par la bourse de recherche SFETD/CNP. Ils avaient pour thème : l'utilisation de méthodes non médicamenteuses dans la prévention de la douleur provoquée par les soins. La recherche en soins amène ensuite à l'écriture consensuelle de recommandations de bonne pratique. Celles-ci serviront à la mise en œuvre de programmes d'évaluation des pratiques professionnelles préconisés par la Haute Autorité de santé dans le cadre du développement professionnel continu. Les équipes soignantes, valorisées par des formations qualifiantes, impliquées dans des programmes pluridisciplinaires de recherche et d'évaluation des pratiques, quels que soient leur lieu d'exercice ou les douleurs rencontrées, participeront à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au meilleur bénéfice pour les patients douloureux.